丹溪先生心法

附錄

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

丹溪先生心法

附錄

(一)

朱震亨撰
程充編訂

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

丹溪先生心法序

醫之先謂出于神農、黃帝。儒者多不以爲然。予嘗考醫之與卜並見于周禮。曰醫師隸冢宰。筮人隸宗伯。並稱于孔子曰。人而無恆不可以作巫醫。巫筮字蓋古通也。然卜之先實出于羲、文、周、孔。則醫之先謂出于神農、黃帝亦必有所從來。大約羲、文、周、孔之書存。故卜之道尊。神農、黃帝之書亡。故醫之道卑。然其書雖亡而緒餘之出于先秦者。殆亦有之。若今本草、素問、難經、脈經。此四書者。其察草木鳥獸金石之性。論陰陽風寒暑濕之宜。標其穴以施鍼焫。診其脈以究表裏。測諸秋毫之末。而活之危亡之餘。類非神人異士不足以啓其機緘而發其肯綮。則此四書者。誠有至理。不可謂非出于聖筆而遂少之也。然則醫之與卜皆聖人之一事。必儒者乃能知之。其不以爲然者。不能通其說者也。醫之方書。皆祖漢張仲景之言。實與前四書相出入。亦百世不能易者。自漢而後。代不乏賢。中古以來。予所取五人。曰孫思邈氏。其言嘗見錄于程子。曰張元素氏。曰劉守眞氏。曰李杲氏。皆見稱于魯齋許文正公。曰朱震亨氏。實白雲許文懿公高第弟子。斯五人者。皆儒者也。而朱氏實淵源于張、劉、李三君子。尤號集其大成。朱氏每病世之醫者專讀宋之局方。執一定之法。以應無窮之疾。譬之儒者專誦時文。以倖一第。而於聖經賢傳反不究心。乃作局方發揮、格致餘論等書。深有補于醫道。而方書所傳。則有丹溪心法若干卷。推脈以求病。因病而治藥。皆已設之方也。朱氏沒而其傳泯焉。近世儒者始知好之。稍稍行世。然業醫者樂檢方之易。而憚讀書之

難于素、難諸書蓋皆不能以句而於五人者之著述則亦視爲迂闊之論其茫然不知所用力無足怪者其以藥試人之疾間一獲效則亦如村甿牧豎望正鵠而射之偶爾中焉或從其旁問之射法瞠目相視不知所對彼老成者日從事乎內志外體之間雖或小有所失而矢之所向終無大遠此觀射之法也審醫之能何以異此予宗人用光世業儒而好醫其讀素、難之書甚稔最喜朱氏之說嘗以丹溪心法有川陝二本妄爲世醫所增附深懼上有累于朱氏乃爲之彪分臚列釐其誤而去其複以還其舊凡朱氏之方有別見者則以類入之書成將刻梓以傳請予序予故以多病好醫而未能也輒以醫卜並言于編首使業醫者知其道本出于聖人其書本足以比易而非可以自卑則日勉焉以致力乎本草、素、難、脈經之書以及五君子之說而尤以朱氏爲入道之門則庶幾乎上可以輔聖主拯世之心下可以見儒者仁民之效而醫不失職矣用光名充休寧汊口人與予同出梁將軍忠壯公後

成化十八年歲次壬寅春二月既望賜進士及第奉訓大夫左春坊左諭德同修國史經筵官兼太子講讀官休寧程敏政序

丹溪先生心法序

夫驅邪扶正。保命全眞。拯夭閼於長年。濟疲癃於仁壽者。非資于醫則不能致之矣。醫之道肇自軒、岐論難、靈素出焉。降而和、緩、扁、倉、咸神其術。至漢張仲景作傷寒卒病論。始製方劑。大濟烝民。晉王叔和撰次其書。復集脈經。全生之術。於斯備矣。他如華氏剖腹。王氏鍼妖。與夫奇才異士。間有一節一法取衒於時者。亦多非百代可行之活法也。嗟夫。去古愈遠。正道湮微。寥寥千載之下。孰能繼往開來而垂法於無窮者。宋金間。上谷張元素、河間劉守眞。俱以穎特之資。深達圖奧。高出前古。元素之學。東垣李杲深得之。明內傷之旨。大鳴於時。王海藏、羅謙甫又受業於東垣。羅太無、亦私淑諸賢者也。明哲迭興。肩摩踵接。著爲方論。究極精微。猶水火穀粟之在天下。不可一日無。遵而用之。困甦廢起。斯民何其幸歟。泰定中。丹溪朱先生起江東。先生許文懿公高第。諱震亨。字彦脩。婺之烏傷人。爲元鉅儒。因母病脾。刻志於醫。曰。醫者、儒家格物致知一事。養親不可缺。遂遍遊江湖。尋師無所遇。還杭。拜羅太無。乃得劉、張、李之學以歸。窮研素問之旨。洞參運氣之機。闢局方之非宜。悟戴人之攻擊。別陰陽于疑似。辨標本於隱微。審察血氣實虛。探究眞邪強弱。一循活法。無泥專方。誠醫道之宗工。性命之主宰。而集先賢之大成者也。其徒趙以德、劉叔淵、戴元禮氏咸能翼其道。遺書傳播。有年。景泰中。楊楚玉集其心法。刊于陜右。成化初。王季瓚附方重梓於西蜀。志欲廣布海內。使家傳人誦。不罹夭枉。其用心仁矣。而楊之集、篇目或有重出。而亦有遺。附以他

論。使玉石不分。王因之附添諸方。多失本旨。充、江左一愚夫。志于此。每閱是書。實切病焉。輒不自揆。妄意竊取平治會萃經驗等方。及玉機微義、衛生寶鑑、濟生拔萃、東垣、河間諸書校之。究尾會首。因證求方。積日既久。復得今中書烏傷王允達先生以丹溪曾孫朱賢家藏的本寄示。合而參考。其或文理乖訛。意不相貫者。詳求原論。以正其誤。篇目錯綜。前後重疊者。芟去繁冗。以存其要。此有遺而彼有載者。采之以廣其法。論既詳而方未備者。增之以便檢閱。一言去取。無敢妄有損益。庶幾丹溪之書。猶涇渭合流。清濁自別。鳥鼠同棲。皂白攸分。學者免惑於他岐。疾疢得歸於正治。未知其然否乎。極知僭踰。無所逃罪。同志之士。倘矜其愚。正其訛舛而賜教之。則充之至願也。於是乎書。

成化十七年歲次辛丑仲冬休寧後學復春居士程充謹識。

丹溪先生心法目錄

十二經見證
不治已病治未病
亢則害承迺制
審察病機無失氣宜
能合色脈可以萬全
治病必求於本

卷一

中風一
肥人中風口喎方
癱左方
二陳湯
通頂散
烏藥順氣散
婦手足左癱方
體肥中風方
稀涎散
八味順氣散
星香湯

省風湯
小續命湯
如神救苦散
三化湯
四白丹
瀉青丸
藿香正氣散
活絡丹
子和搜風丸
中寒二　附傷寒傷風
理中湯
四逆湯
霹靂散
消風百解散
中暑三　附暑風注夏
小省風湯
家寶丹
大秦艽湯
愈風湯
二丹丸
天麻丸
他仙丹
不臥散
潤腸丸
桂枝湯
三建湯
姜附湯

暑渴方
黃龍丸
香薷飲
大順散
清暑益氣湯
五苓散
桂苓甘露飲
冷香飲子
中濕四
羌活勝濕湯
三花神佑丸
瘟疫五　附大頭天行病
入方
又時病
作人中黃法
生脈湯
卻暑散
黃連香薷飲
十味香薷飲
天水散
人參白虎湯
縮皮飲
黃連解毒湯
防己黃芪湯
舟車丸
又方
治大頭方
漏蘆湯

消毒丸
火六
左金丸
升陽散火湯
卷二
班疹七
調中湯
涌聖散
化斑湯
瘡八
入方
截瘡常山飲
又治瘡寒熱頭痛方
截瘡青蒿方
又瘡疾後方
潔古雄黃丸
東垣瀉陰火升陽湯
地骨皮散
消毒犀角飲子
元參升麻湯
大建中湯
又方
又治瘡母方
又治瘡渴方
截瘡
清脾湯

七棗湯
山甲湯
秘方清脾丸
草果飲子
參蘇飲
小柴胡湯
小柴胡加桂湯
大柴胡湯
痢九
入方
治白痢
又五方
胃風湯
戴人木香檳榔丸
大承氣湯
驅瘧飲
六和湯
紅丸子
人參養胃湯
柴胡桂姜湯
白虎加桂枝湯
桂枝加黃芪知母石膏湯
白芷石膏三物湯
又二方
治赤痢
治痢十法
噤口痢
調胃承氣湯
小承氣湯

防風芍藥湯
蒼朮防風湯
神芎導水丸
聖餅子
宣明玄青膏
漿水散
麴蘗丸
錢氏白朮湯
泄瀉十
老人脾泄方
止瀉姜麴丸
清六丸
大已寒丸
香連丸
戊己丸
神朮散
敗毒散
和中丸
蘇感丸
保命集四物湯
升陽益胃湯
機要白朮芍藥湯
黃連阿膠丸
治痛泄
又方
又方
八味湯
升陽除濕湯
胃苓湯

朮附湯
酒蒸黃連丸
椒附丸
結燥十一
入方
潤燥湯
半硫丸
脾約丸
霍亂十二
加味二陳湯
六和湯
木瓜湯
痰十三
青礞石丸
中和丸
感應丸
五味子散
二神丸
導滯通幽湯
活血潤燥丸
麻仁丸
又方
通脈四逆湯
又三方
又方

導痰湯
潤下丸
小胃丹
治鬱痰
茯苓丸
久吐痰喘
白玉丸
又二方
清膈化痰丸
墜痰丸
祛風痰行濁氣
痰氣方
清痰丸
哮喘十四
入方
又方
千緡湯
治酒痰
導痰丸
又二方
黃連化痰丸
黃瓜蔞丸
抑痰丸
搜風化痰丸
治濕痰二方
上焦風痰
利膈化痰丸
治哮喘積方

紫金丹
喘十五
痰喘二方
分氣紫蘇飲
四磨湯
小青龍湯
九寶湯
咳嗽十六　附肺痿肺癰
入方
又四方
治風熱痰嗽方
又方
定嗽劫藥
青金丸
清化丸
劫喘藥
神秘湯
三拗湯
華蓋散
活人書五味子湯
清化丸
治婦人方
治勞嗽吐紅
嗽烟筒
又方
清金丸
又二方

蒼莎丸
海藏紫苑散
桔梗湯
勞瘵十七
入方
樂令建中湯
清骨散
十灰散
獨參湯
保眞湯
消化丸
吐血十八
二黃補血湯
四生丸
犀角地黃湯
人參清肺散
知母茯苓湯
團參飲子
蓮心散
黃芪鼈甲散
葛可久治勞法
又方
保和湯
太平丸
潤肺膏
又二方
大阿膠丸
桃仁承氣湯

荆芥散
咳血十九
入方
茯苓補心湯
嘔血二十
嘔血二方
咯血二十一　附痰涎血
痰中血四方
天門冬丸
衄血二十二
河間生地黃散
茜根散
止衄散
又法
溺血二十三
小建中湯
黃芪散
保命生地黃散
治咯血四方
又方
黃芩芍藥湯
芎附飲

小薊飲子
當歸承氣湯
鹿茸丸
瑞竹堂蒲黃散
下血二十四
入方
槐花散
烏梅丸
黑神散
腸風臟毒二十五
七方
又方
芎歸湯
小烏沉湯
痔瘡二十六
許令公方
膠艾湯
辰砂妙香散
又二方
又六方
黃連丸
蒜連丸
不換金正氣散
枳殼散

入方
治諸痔瘡
清涼飲
蝟皮丸
芎歸丸
橘皮湯
地黃丸
翻花痔
漏瘡二十七
黃連散
乳香丸
蛇蛻散
洗漏瘡方
漏瘡
熏洗方
清心丸
槐角丸
猪甲散
乾葛湯
熏洗方四方
熏痔三方
猪腎丸
生地黃膏
熏漏瘡方
久痿方
又方

卷三

脫肛二十八
香荆散
嘔吐二十九
理中加丁香湯
濟生竹茹湯
吐蟲而嘔方
惡心三十
大半夏湯
欬逆三十一
橘皮乾姜湯
陰證欬逆
羌活附子湯
小半夏茯苓湯
翻胃三十二
四方
又二方
活人生姜橘皮湯
加味二陳湯
小半夏茯苓湯
生姜半夏湯
人參白朮湯
橘皮竹茹湯
木香調氣散
燒針丸

棗肉平胃散
吞酸三十三　附噯氣
入方
加味平胃散
痞三十四
入方
枳實消痞丸
枳朮丸
嘈雜三十五
傷食三十六
治氣抑痰倦不思食
治喫麵傷
加味二陳湯
疸三十七
小溫中丸
麵朮丸
治噯氣方
玉液丸
橘皮枳朮丸
治心腹膨
補脾丸
紅丸子
大溫中丸

茵陳蒿湯
硝石礬石散
茵陳五苓散
濟生穀疸丸
三因當歸白朮湯
濟生葛根湯
水腫三十八
加味五皮散
大橘皮湯
又方
禹功散
鼓脹三十九
中滿分消丸
紫蘇子湯
禹餘糧丸
梔子大黃湯
瓜蒂散
濟生茵陳湯
三因白朮湯
濟生五苓散
濟生黃芪散
踈鑿飲子
十棗丸
嚴氏實脾散
加味枳朮湯
廣茂潰堅湯
人參芎歸湯
抵當丸

紺珠木香檳榔丸
小便不通四十
草密湯
又七方
小便不禁四十一
秘元丹
三因家韭子丸
關格四十二
淋四十三
入方
又方
五淋散
又方
沙石淋方
又四方
蒲黃湯
暖腎丸
地髓湯
二神散
車前子散
茯苓調血湯
木香湯
博濟方

又方
白微散
沉香散
生附湯
清心蓮子飲
參茯琥珀湯
赤白濁四十四
二方
半夏丸
茯菟丸
又二方
玄兎丹
夢遺四十五　附精滑
入方
溫膽湯
通秘散
髮灰散
又方
八正散
又三方
灸法
定志丸
草薢分清飲
瑞蓮丸
珍珠粉丸
感喜丸

消渴四十六
入方　茯菟丸
麥門冬飲子　加味錢氏白朮散
地黃飲子　加減八味丸
清心蓮子飲　川黃連丸
玉泉丸　三黃丸
發熱四十七　附胸中煩熱　虛熱　虛煩不眠
入方　治手心發熱
治煩不得眠　治大病後虛熱
濕痰發熱　退勞熱食積痰
火鬱湯　神芎丸
惡寒四十八　附面熱面寒
升麻加黃連湯　升麻附子湯
自汗四十九
玉屏風散　大補黃芪湯

調衛湯
又方
涼膈散
盜汗五十
當歸六黃湯
又方
麥煎散
補損五十一
大補丸
補腎丸
虎潛丸
湯藥
三補丸五方
瑣陽丸
又方
溫粉
黃芪建中湯
黃芪六一湯
正氣湯
又方
龍虎丸
補天丸
補虛丸
補陰丸七方
五補丸
補心丸
大補丸

濟陰丸
茯神湯
三才封髓丹
八味丸
還少丹
巴戟丸
海藏大五補丸
小兔絲子丸
人參養榮湯
延壽丹
滋血百補丸
巨勝子丸
沉香百補丸
明目益腎丸
地芝丸
十全大補丸
金匱腎氣丸
八物湯
無比山藥丸
補益腎肝丸
八味定志丸
補腎丸
十四味建中湯
價寶丹
添精補髓丹
固精丸
如意丸
滋腎百補丸
固眞丸
黃連茯苓丸

延生護寶丹
八物腎氣丸
肉蓯蓉丸
秘眞丸
六鬱五十二
六鬱湯
內傷五十三
補中益氣湯
積聚痞塊五十四
消塊丸
琥珀膏
治血塊丸三方
阿魏丸四方
小溫中丸二方
大溫中丸
柏子仁丸
延齡丹
益壽地仙丹
越鞠方
枳朮丸
三聖膏
又三方
和保丸三方
佐脾丸
枳實丸
烏梅丸

備急丸
大七氣湯
香稜丸
脚氣五十五　附足跟痛
防己飲
健步丸
溫痰脚氣方
應痛丸
六物附子湯
除濕丹
麻黃左經湯
大黃左經湯
卷四
痿五十六
健步丸
治吐虫積方
散聚湯
又方
又方
腳軟筋痛
又二方
當歸拈痛湯
東垣開結導飲丸
五積散
東垣羌活導滯湯
清燥湯

厥五十七　附手足十指麻木
調氣散　平胃散
四七湯
痓五十八
葛根湯　桂枝加葛根湯
癇五十九
續命湯　古方三癇丸
本事人參散　寧神丹
東垣安神丸
顛狂六十
二方
驚悸怔忡六十一
入方　養心湯
寧志丸　朱雀丸
加味四七湯　朱砂安神丸

健忘六十二
歸脾湯
痛風六十三　附肢節痛
入方
臂痛方
趁痛散
四炒散
治骨節痛方
治食積肩腿痛
龍虎丹
癮風六十四　附身上虛痒
醉仙散
黃精丸
治麻風脈大而虛
凌霄花散
定志丸
白濁痛風方
二妙散
八珍丸
又方
又方
控延丹
乳香丸
再造散
又方
治麻風二方
東坡四神丹

浮萍散
身上虛痒方
纏喉風喉痹六十五　附咽痛咽瘡
雄黃解毒丸
又方
頭風六十六
入方四方
頭痒風屑髮黃方
治頭風
消風散
三五七散
頭眩六十七
頭暈方
白附子丸
芎朮除眩散
局方升麻湯
又方
潤喉散
瘦人搐藥
一粒金搐鼻方
頭風鼻塞方
茶調散
香橘飲
人參前胡湯
茯苓桂枝白朮甘草湯

正元散
頭痛六十八
清空膏
徹清膏
不臥散
治頭痛
治頭痛如破
眉眶痛六十九
入方二方
生熟地黃丸
四神散
心脾痛七十
入方八方
死血痛方
草荳蔻丸
黑錫丹
安神湯
順氣和中湯
半夏白朮天麻湯
治頭痛連眼痛
選奇方
芎辛湯
脈澁心脾常痛方
痰飲痛方
丁香止痛散

失笑散　二姜丸
扶陽助胃湯　烏梅丸
脇痛七十一
小龍會丸　當歸龍會丸
抑青丸　推氣散
枳芎散　十棗湯
腹痛七十二　附腹中窄狹　絞腸沙
入方四方　小建中湯
腰痛七十三　附腎著
入方四方　摩腰膏
青娥丸　獨活寄生湯
治腰痛方　腎著湯
滲濕湯
疝痛七十四　附木腎　腎囊濕瘡
入方　守效丸

又二方
又二方
積疝方
疝痛塊痛方
治小腸氣又木腎偏墜
耳聾七十五
入方三方
桂星散
益智散
耳鳴方
蔓荊子散
盯耳方
桃花散
鼻病七十六
入方二方
橘核散
腎氣方
又三方
治木腎二方
腎囊濕瘡三方
和劑流氣飲
地黃丸
芎芷散
耳鳴暴聾方
又二方
耳爛方
滾痰丸
治鼻中瘜肉

治鼻淵　白龍丸
又三方　鉛紅散
輕黃散
眼目七十七
神效七寶膏　爛眶眼方
生熟地黃丸　病眼方
瀉熱黃連湯　上清散
東垣熟乾地黃丸
口齒七十八
入方　治滿口白爛
黑參丸　柳花散
增損如聖湯　甘桔散
治牙痛六方　固齒方
刷牙藥
破滯氣七十九　附氣刺痛　附諸氣

和劑七氣湯
指迷七氣湯
流氣飲子
大七氣湯
蘇子降氣湯
蟠葱散
分氣紫蘇飲
聚香飲子
烏藥平氣散
手拈散
鹽煎散
分氣紫蘇飲
大玄胡湯
東垣木香順氣散
順氣木香散
三因七氣湯
加減七氣湯
和劑流氣飲
分心氣飲三方
三和散
治氣六合湯
木香化滯散
沉香降氣湯
復元通氣散
枳殼煮散
東垣升陽順氣湯
鷄舌香散
化氣散
匀氣散
快氣散

異香散
降氣湯
脾胃八十　附胃風
調中益氣湯
六君子湯
參苓白朮散
丁沉透膈湯
枳縮二陳湯
凝神散
癭氣八十一　附結核
入方
跌撲損傷八十二
攔撲二方
又方
破傷風八十三
化氣湯
木香化滯湯
四君子湯
胃苓湯
治中湯
五膈寬中散
八珍湯
結核三方
接骨散

入方
元戎破傷風方
諸瘡痛八十四　附天泡瘡　凍瘡
入方四方
郭氏升麻牛旁子散
當歸飲子
凍瘡方
卷五
癰疽八十五
乳癰七方
環跳穴痛方
圍藥二方
騎馬癰方二方
肛門生癤方
便毒三方
天麻丸
一上散
升麻和氣飲
天疱瘡方
附骨癰方
鉄圈散
膈皮取膿法
敷疽癤方
取朽骨方
消毒飲

內托復煎散
疔癰八十六
入方
神聖膏
破棺丹
尅效散
金湯疳癬諸瘡八十七
金瘡四方
腠瘡五方
癬瘡四方
冰霜散
下疳瘡洗藥
婦人八十八
入方三方
經事過期方
內疎黃連湯
保生挺子
千金托裏散
太乙膏
東垣升陽調經湯
火燒三方
杖瘡三方
下疳瘡二方
聖粉方
四物湯
交加地黃丸

當歸散
通經丸
崩漏八十九
小薊湯
又方
涼血地黃湯
帶下九十
入方六方
固腸丸
戴人玉燭散
產前九十一
固胎方
達生散
安胎方
子腫方
琥珀散
紅花當歸散
荆芥散
如聖散
結痰白帶方
又三方
束胎丸
又方
惡阻方
三因鯉魚湯

參朮飲
膠艾湯
催生方
催生如聖散
胞衣不下方
產後九十二
產後補虛方
又三方
參朮膏
黑神散
子嗣九十三　附斷子法
小兒九十四
黑龍丸
牛黃奪命散
五積丸
胎動方
難產方
天麻丸
又四方
產後消血塊方
獨行丸
清魂散
驚熱方
胡黃連丸
烏犀丸

黃龍丸
食積方二方
大蘆薈丸
子癇方
白附丸
腹痛方
吐瀉黃疸方
斑疹方
龜胸方
鈎藤散
入方三方
咯血方
吃泥方
解顱方
錢氏白朮散
肥兒丸
集聖丸
褐丸子
風痰方
紫金泥
腹脹方二方
痢疾方二方
口糜方四方
夜啼方二方
脫肛脫囊方二方
木舌方
尿血方
叉方
吐蚘方
口噤方

禿頭方三方
臍腫方
赤溜方
鼻赤方
瘡疾痞塊方
痘瘡九十五
解痘瘡毒方二方
犀角地黃湯
紫草飲子
宣風散
參蘇飲
升麻葛根湯
加味四聖散
紫草木通湯
絲瓜湯
頭瘡方四方
天火丹方
月蝕瘡方
辛夷膏
痘瘡敷藥方
人參敗毒散
百祥丸
惺惺散
人參羌活散
化毒湯
紫草木香湯
快班散二方
大連翹湯

甘露飲子　四順清涼飲
如聖飲子　鼠粘子湯
麻黃黃芩湯　桔梗枳殼湯
甘草散　烏梅湯
木香理中湯　獨聖散
又方　犀角消毒飲
論倒倉法九十六
論吐法九十七
救急諸方九十八
拾遺雜論九十九
秘方一百
附錄
故丹溪先生朱公石表辭
丹溪翁傳
右楊楚玉類集心法中間水腫、虛腫、痛風、肢節痛、麻木、婦人小便不通等證文多重出又取別論附

於其間雖能補其缺略不免混淆難別致丹溪主病之旨不明王季斌因正論及附論中方未備載又作附錄如夢遺椿樹根丸淋證六味地黃丸婦人三補丸等不錄丹溪原方却於他書取方名相同增入藥味與病懸隔（充）恐用者不察反致有誤今以丹溪原論考訂遺誤錄於症首次附戴元禮辨症次錄正方以見正法不雜其附論不去題曰附錄用存編者之意也復盡載附論中方題曰附方恐人妄去取也庶幾明白又增入外科倒倉等法以翼其未備觀者詳焉

成化庚子花朝日程充識

丹溪先生心法

十二經見證

足太陽膀胱經見證

頭苦痛。目似脫。頭兩邊痛。淚出。臍反出。下腫便膿血。肌肉痿。項似拔。小腹脹痛。按之欲小便不得。

足陽明胃經見證

惡與火聞木聲則驚。狂。上登而歌。棄衣而走。顏黑。不能言。脣腫。嘔。呵欠。消穀善飲。頸腫。膺乳冲股伏兔跗外廉足跗皆痛。胸傍過乳痛。口喝。腹大水腫。奔豚脹。跗內廉附痛。脾不可轉。腘似結。腨似裂。膝臏腫痛。遺溺失氣。善伸數欠。癲疾。濕浸心欲動。則閉戶獨處。驚。身前熱。身後寒慄。

足少陽膽經見證

口苦。馬刀挾癭。胸中脇肋髀膝外至胻絕骨外踝前諸節痛。足外熱。寢寒憎風。體無膏澤。善太息。

手太陽小腸經見證

面白。耳前熱苦寒。頰頷腫不可轉。
腰似折。肩臑肘臂。外後廉腫痛。
臑臂內前廉痛。

手陽明大腸經見證

手大指次指難用。耳聾。煇煇焞焞。耳鳴嘈嘈。耳後肩臑肘臂外背痛。
氣滿。皮膚殼殼然。堅而不痛。

足太陰脾經見證

五泄注下五色。大小便不通。面黃。
舌木強痛。口疳。食卽吐。食不下咽。
怠惰嗜臥。搶心。善飢善味。不嗜食。不化食。尻陰股膝臑胻。足背痛。煩悶。心下急痛。
有動痛。按之若牢。痛當臍。心下若痞。
腹脹。腸鳴。飧泄不化。足不收行。善瘈。腳下痛。九竅不通。溏泄水下後出餘氣。則快然。
飲發中滿。食減。善噫。形醉。皮膚潤而短氣。肉痛。身體不能動搖。足溏腫若水。

足少陰腎經見證

面如漆。眇中清。面黑如炭。咳唾多血。渴。臍左。脇下背肩髀間痛。

胸中滿。大小腹痛。大便難。飢不欲食。心中如飢。腹大。頸腫。喘嗽。脊臀股後痛。脊中痛。脊股內後廉痛。腰冷如冰及腫。足痿厥。臍下氣逆。小腹急痛。泄。下腫。足胒寒而逆。腸癖。陰下濕。四指正黑。手指清厥。足下熱。嗜臥。坐而欲起。凍瘡。下痢。善思。善恐。四肢不收。四肢不舉。

足厥陰肝經見證

頭痛。脫色善潔。耳無聞。頰腫。肝逆。頰腫。面青。目赤腫痛。兩脇下痛引小腹。胸痛。背下則兩脇腫痛。婦人小腹腫。腰痛不可俛仰。四肢滿悶。挺長熱。嘔逆。血。腫睾疝。暴痒。足逆寒。胒善瘈。節時腫。遺瀝淋溲。便難癃。狐疝。洞泄。大人癲疝。眩冒。轉筋。陰縮。兩筋攣。善恐。胸中喘罵詈。血在脇下喘。

手太陰肺經見證

善咳。缺盆中痛。臍上。肩痛。肩背痛。臍右。小腹脹引腹痛。小便數。溏泄。皮膚痛及麻木。喘少氣。頰上氣見。

交兩手而瞀悲愁欲哭。洒淅寒熱。

手少陰心經見證

消渴。兩腎內痛。後廉。腰背痛。浸淫善笑。善恐善忘。上咳吐下氣泄。眩仆。身熱而腹痛。悲。

手厥陰別脈經見證心主

笑不休。手心熱。心中大熱。面黃目赤。心中動。

手足陰陽經合生見證

頭項痛。足太陽、手少陰。黃疸。足太陰、少陰。

面赤。手少陰、厥陰、手足陽明。

目黃。手陽明、少陰、太陽、厥陰、足太陽。

耳聾。手太陽、陽明、少陽、太陰、足少陽。

喉痹。手足陽明、手少陽。

鼻鼽衄。手足陽明、太陽。

目瞤瞤無所見。足少陰、厥陰。

目瞳人痛。足厥陰。面塵。足厥陰、少陰。

咽腫。足少陰、厥陰。
嗌乾。手太陰、足少陰、厥陰、手少陰、太陽。
噦。手少陽、足太陰。
膈咽不通。不食。足陽明、太陰。
胸滿。手太陰、足厥陰、手厥陰。
胸支滿。手厥陰、少陰。腋腫。手厥陰、足少陽。
脇痛。手少陰、足少陽。胸中痛。手少陰、足少陽。
善嘔苦叶。足少陽、足陽明逆。
少氣。咳嗽。喘渴。手太陰、足少陰。
喘。手陽明、足少陰、手太陰。
臂外痛。手太陽、少陽。
掌中熱。手太陽、陽明、厥陰。
肘攣急。手厥陰、太陰。腸滿脹。足陽明、太陰。
心痛。手少陰、厥陰、足少陰。
痔。足太陽、手足太陰、熱。

凄然振寒。足陽明、少陽。
如人將捕。足少陰、厥陰。
瘧。足太陰、足三陽。
汗出。手太陽、少陰、足陽明、少陽。
身體重。手太陰、少陰。

不治已病治未病

與其救療於有疾之後。不若攝養於無疾之先。蓋疾成而後藥者。徒勞而已。是故已病而不治。所以爲醫家之法。未病而先治。所以明攝生之理。夫如是則思患而預防之者。何患之有哉。此聖人不治已病治未病之意也。嘗謂備土以防水也。苟不以閉塞其涓涓之流。則滔天之勢不能遏。備水以防火也。若不以撲滅其熒熒之光。則燎原之焰不能止。其水火既盛。尙不能止遏。況病之已成。豈能治歟。故宜夜臥早起於發陳之春。早起夜臥于蕃秀之夏。以之緩形無怒而遂其志。以之食涼食寒而養其陽。聖人春夏治未病者如此。與鷄俱興于容平之秋。必待日光於閉藏之冬。以之斂神匿志而私其意。以之食溫食熱而養其陰。聖人秋冬治未病者如此。或曰。見肝之病。先實其脾藏之虛。則木邪不能傳。見右頰之赤。先瀉其肺經之熱。則金邪不能盛。此乃治未病之法。今以順四時調養神志。而爲治未病者。是何意邪。蓋保身長全者。所以爲聖人之道。治病十全者。所以爲上工術。不治已病

治未病之說。著於四氣調神大論。厥有旨哉。昔黃帝與天師難疑答問之書。未嘗不以攝養爲先。始論乎天眞。次論乎調神。既以法於陰陽而繼之以調於四氣。既曰食飲有節而又繼之以起居有常。諄諄然以養生爲急務者。意欲治未然之病。無使至於已病難圖也。厥後秦緩達乎此。見晉侯病在膏肓。語之曰不可爲也。扁鵲明乎此。視齊侯病在骨髓。斷之曰不可救也。噫。惜齊晉之侯不知治未病之理。

亢則害承迺制

氣之來也。既以極而成災。則氣之乘也。必以復而得平。物極則反。理之自然也。大抵寒暑燥濕風火之氣。木火土金水之形。亢極則所以害其物。承乘則所以制其極。然則極而成災。復而得平。氣運之妙。灼然而明矣。此亢則害承迺制之意。原夫天地陰陽之機。寒極生熱。熱極生寒。鬼神不測。有以斡旋宰制於其間也。故木極而似金。火極而似水。土極而似木。金極而似火。水極而似土。蓋氣之亢極。所以承之者反勝於已也。夫惟承其亢而制其害者。造化之功可得而成者也。今夫相火之下。水氣承而火無其變。水位之下。土氣承而水氣無其戕。土位之下。木承而土順。風位之下。金乘而風平。火熱承其燥。金自然金家之疾。陰精承其君火。自然火家之侯。所謂亢而爲害承而迺制者。如斯而已。且嘗考之六元正紀大論云。少陽所至。爲火生。終爲蒸溽。火化以生。則火生也。陽在上。故終爲蒸溽。是水化以承相火之意。太陽所至。爲寒雪冰雹白埃。是土化以承寒水之意也。霜雪冰雹水也。白埃

下承土也。以至太陰所至。爲雷霆驟注烈風。雷霆驟注土也。烈風下承之木氣也。厥陰所至。爲風生。終爲肅風化以生。則風生也。肅靜也。申明所至爲散落溫。散落金也。溫若乘之火氣也。少陰所至。爲熱生。中爲寒。熱化以生。則熱生也。陰精承上。故中爲火也。豈非亢爲害則承迺制者歟。昔者黃帝與岐伯。上窮天紀。下極地理。遠取諸物。近取諸身。更相問難。以作內經。至於六微旨大論。有極於六氣相承之言。以爲制則生化。外別盛衰。害則敗亂。生化大病。諸以所勝之氣來於下者。皆折其標盛也。不然曷以水發而雹雪。土發而驟飄。木發而毀折。金發而清明。火發而曛昧。此皆鬱極迺發。以承所亢之意也。嗚呼。通天地人曰儒。醫家者流。豈止治疾而已。當思其不明天地之理。不足以爲醫工之語。

審察病機無失氣宜

邪氣各有所屬也。當窮其要於前。治法各有所歸也。當防其差於後。蓋治病之要。以窮其所屬爲先。苟不知法之所歸。未免於無差爾。是故疾病之生。不勝其衆。要其所屬。不出乎五運六氣而已。誠能於此審察而得其機要。然後爲之治。又必使之各應於運氣之宜。而不至有一毫差誤之失。若然則治病求屬之道。庶乎其無愧矣。乎至眞要大論曰。審察病機。無失氣宜。意蘊諸此。嘗謂醫道有一言而可以盡其要者。運氣是也。天爲陽。地爲陰。陰陽二氣各分三品。謂之三陰三陽。然天非純陽而亦有三陰。地非純陰而亦有三陽。故天地上下各有風熱火濕燥寒之六氣。其斡旋運動乎兩間者。而

又有木火土金水之五運。人生其中。藏府氣穴。亦與天地相爲流通。是知衆疾之作。而所屬之機無出乎是也。然而醫之爲治。當如何哉。惟當察乎此。使無失其宜而後可。若夫諸風掉眩。皆屬肝木。諸痛痒瘡。皆屬心火。諸濕腫滿。皆屬脾土。諸氣膹鬱。皆屬肺金。諸寒收引。皆屬腎水。此病屬於五運者也。諸暴强直。皆屬於風。諸嘔吐酸。皆屬於熱。諸躁擾狂越。皆屬於火。諸痙强直。皆屬於濕。諸澁枯涸。皆屬於燥。諸病水液澄徹清冷。皆屬於寒。此病機屬於六氣者也。夫惟病機之察。雖曰既審。而治病之施。亦不可不詳。故必別陰陽於疑似之間。辨標本於隱微之際。有無之殊者。求其有無之所以殊。虛實之異者。責其虛實之所以異。爲汗吐下投其所當投。寒熱溫涼用其所當用。或逆之以制其微。或從之以導其甚。上焉以遠司氣之犯。中焉以辨歲氣之化。下焉以審南北之宜。使小大適中。先後合度。以是爲治。又豈有差殊乖亂之失耶。又考之內經曰。治病必求其本。本草曰。欲療病者。先察病機。此審病機之意也。六元正紀大論曰。無失天信。無逆氣宜。五常大論曰。必先歲氣。無伐天和。此皆無失氣宜之意也。故素問靈樞之經。未嘗不以氣運爲言。既曰先立其年。以明其氣。復有以戒之曰。治病者必明天道地理。陰陽更勝。既曰不知年之所加。氣之盛衰。虛實之所起。不可以爲工矣。諄諄然若有不能自已者。是豈聖人私憂過計。或以醫道之要。悉在乎此也。觀乎原病式一書。比類物象。深明乎氣運造化之妙。其於病機氣宜之理。不可以有加矣。

能合色脈可以萬全

欲知其內者。當以觀乎外。診於外者。斯以知其內。蓋有諸內者。形諸外。苟不以相參而斷其病邪之逆順。不可得也。爲工者深燭厥理。故望其五色。以青黃赤白黑。以合於五藏之脈。窮其應與不應。切其五脈。急大緩嗇沈。以合其五藏之色。順與不順。誠能察其精微之色。診其微妙之脈。內外相參而治之。則萬舉萬全之功。可坐而致矣。素問曰。能合色脈。可以萬全。其意如此。原夫道之一氣。判而爲陰陽。散而爲五行。而人之所稟。皆備焉。夫五脈者。天之眞。行血氣。通陰陽。以榮於身。五色者。氣之華。應五行。合四時。以彰於面。惟其察色按脈。而不偏廢。然後察病之機。斷之以寒熱。歸之以藏府。隨證而療之。而獲全濟之效者。本於能合色脈而已。假令肝色如翠羽之青。其脈微弦而急。所以爲生。若浮濇而短。色見如草滋者。豈能生乎。心色如鷄冠之赤。其脈當浮大而散。所以爲順。若沉濡而滑。色見如衄血者。豈能順乎。脾色如蟹腹之黃。其脈當中緩而大。所以爲從。若微弦而急。色見如枳實者。豈能從乎。肺色如豕膏之白。其脈當浮濇而短。所以爲吉。若浮大而散。色見如枯骨者。豈能吉乎。以至腎色見如烏羽之黑。其脈沉濡而滑。所以爲生。或脈來緩而大。色見如炲者。死。死生之理。夫惟診視相參。既以如此。則藥證相對。厥疾弗瘳者。未之有也。抑嘗論之。容色所見。左右上下。各有其部。脈息所動。寸關尺中。皆有其位。左頰者。肝之部。以合左手關位。肝膽之分。應於風木。爲初之氣。顏爲心之部。以合於左手寸口。心與小腸之分。應於君火。爲二之氣。鼻爲脾之部。合于右手關脈。脾胃之分。應于濕土。爲四之氣。右頰肺之部。合於右手寸口。肺與大腸之分。應於燥金。爲五之氣。頤爲腎之部。

以合於左手尺中腎與膀胱之分應于寒水爲終之氣至於相火爲三之氣應于右手命門三焦之分也若夫陰陽五行相生相勝之理當以合之於色脈而推之也是故脈要精微論曰色合五行脈合陰陽十三難曰色之與脈當參相應然而治病萬全之功苟非合於色脈者莫之能也五藏生成篇云心之合脈也其榮色也夫脈之大小滑濇沉浮可以指別五色微診可以目察繼之以能合色脈可以萬全謂夫赤脈之至也喘而堅白脈之至也喘而浮青脈之至也長而左右彈黃脈之至也大而虛黑脈之至也上堅而大此先言五色次言五脈欲後之學者望而切之以相合也厥後扁鵲明乎此述之曰望而知之謂之神切脈而知之謂之巧洊得內經之理也下迨後世有立方者目之曰神巧萬全厥有旨哉

治病必求於本

將以施其療疾之法當以窮其受病之源蓋疾疢之原不離於陰陽之二邪也窮此而療之厥疾弗瘳者鮮矣良工知其然謂夫風熱火之病所以屬乎陽邪之所客病既本於陽苟不求其本而治之則陽邪滋蔓而難制濕燥寒之病所以屬乎陰邪之所客病既本於陰苟不求其本而治之則陰邪滋蔓而難圖誠能窮原療疾各得其法萬舉萬全之功可坐而致也治病必求於本見於素問陰陽應象大論者如此夫邪氣之基久而傳化其變證不勝其衆也譬如水之有本故能游至汪洋浩瀚洫而趨下以漸大草之有本故能荐生蓂葉實秀而在上以漸蕃若病之有本變化無窮苟非必求

其本而治之欲去深感之患不可得也今夫厥陰爲標風木爲本其風邪傷於人也掉搖而眩轉瞤動而瘈瘲卒暴强直之病生矣少陰爲標君火爲本其熱邪傷於人也瘡瘍而痛痒暴注而下迫水液渾混之病生矣少陽爲標相火爲本其熱邪傷於人也爲熱而瞀瘛躁擾而狂越如喪神守之病生矣善爲治者風淫所勝平以辛涼熱淫所勝平以鹹寒火淫所勝平以鹹冷以其病本於陽必求於陽而療之病之不愈者未之有也太陰爲標濕土爲本其濕邪傷於人也腹滿而身腫按之而沒指諸痙强直之病生矣陽明爲標燥金爲本其燥邪傷於人也氣滯而膚鬱皮膚以皺揭諸澁枯涸之病生矣太陽爲標寒水爲本其寒邪傷於人也吐利而腥穢水液以清冷諸寒收引之病生矣善爲治者溫淫所勝平以辛熱以其病本於陰必求其陰而治之病之不愈者未之有也豈非將以療疾之法當以窮其受病之源者哉抑嘗論之邪氣爲病各有其候治之之法各有其要亦豈止於一端而已其在皮者汗而發之其入裏者下而奪之其在高者因而越之謂可吐也慓悍者按而收之謂按摩也藏寒虛奪者治以灸焫脈病攣痹者治以鍼刺血實畜結腫熱者治以砭石氣滯痰厥寒熱者治以導引經絡不通病生于不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脈者治以熨藥始焉求其受病之本終焉竭其爲病之邪者無出於此也噫昔黃帝處於法宮之中坐於明堂之上受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀萬物變化生殺之妙蓋有不測之神斡旋宰制於其間也人或受邪生病不離於陰陽也病既本於此爲工者豈可他求哉必求於陰陽可也至眞要大論

曰有者求之無者求之此求其病機之說與夫求於本其理一也

丹溪先生心法卷一

明　新安吳中珩　校

中風一

中風大率主血虛有痰。治痰爲先。次養血行血。或屬虛挾火一作痰與溫。又須分氣虛血虛。半身不遂。大率多痰。在左屬死血。痰一作少血。在右屬痰有熱。併氣虛。左以四物湯加桃仁、紅花、竹瀝、姜汁。右以二陳湯四君子等湯加竹瀝、姜汁。痰壅盛者口眼喎斜者。不能言者。皆當用吐法。一吐不已。再吐。輕者用瓜蒂一錢。或稀涎散。或蝦汁。以蝦半斤入醬、蔥、姜等料物水煮。先喫蝦。次飲汁。後以鵝翎探引吐痰用蝦者。蓋引其風出耳。重者用藜蘆半錢。或三分。加麝香少許。藠汁調吐。若口噤昏迷者。灌入鼻內吐之。虛者不可吐。氣虛卒倒者。用參耆補之。有痰濃煎參湯加竹瀝、姜汁。血虛用四物湯。俱用姜汁炒。恐泥痰故也。有痰再加竹瀝、姜汁入內服。能食者去竹瀝加荊瀝。肥白人多溫。少用烏頭、附子行經。凡用烏、附必用童便煮過。以殺其毒。初昏倒急掐人中至醒。然後用痰藥。以二陳湯、四君子湯、四物湯加減用之。

〇瘦人陰虛火熱。用四物湯加牛膝、竹瀝、黃芩、黃柏。有痰者加痰藥。治痰氣實而能食。用荊瀝。氣虛少食。用竹瀝。此二味開經絡。行血氣。故也。入四物湯。必用姜汁助之。遺尿屬氣。以參耆補之。筋枯者。舉

動則痛。是無血不能滋養其筋。不治也。脈訣內言諸不治證。口開。手撒。眼合。遺尿。吐沫。直視。喉如鼾睡。肉脫筋痛。髮直。搖頭上竄。面赤如裝。或頭面青黑。汗綴如珠。皆不可治。

○案內經已下。皆謂外中風邪。然地有南北之殊。不可一途而論。惟劉守眞作將息失宜。水不能制火。極是。由今言之。西北二方。亦有眞爲風所中者。但極少爾。東南之人。多是濕土生痰。痰生熱。熱生風也。邪之所輳。其氣必虛。風之傷人。在肺藏爲多。許學士謂氣中者亦有此七情所傷。脈微而數。或浮而緊緩而遲。必也脈遲浮可治。大數而極者死。若果外中者。則東垣所謂中血脈、中府、中藏之理。其於四肢不舉。亦有與痰相類者。當細分之。局方風痰同治。大謬。發揮甚詳。子和用三法。如的係邪氣卒中。痰盛實熱者可用。否則不可。

【入方】

肥人中風。口喎。手足麻木。左右俱作痰治。

貝母　瓜蔞　南星　荊芥
防風　羌活　黃柏　黃芩
黃連　白朮　陳皮　半夏
薄桂　甘草　威靈仙　天花粉

多食濕麵。加附子、竹瀝、姜汁、酒一匙、行經。

一、婦手足左癱。口不能語。健啖。

防風　荊芥　羌活　南星
沒藥　乳香　木通　茯苓
厚朴　桔梗　麻黃　甘草
全蝎

右爲末。湯酒調下。不效。時春脈伏。漸以淡鹽湯薤汁每早一椀。吐。五日。仍以白朮、陳皮、茯苓、甘草、厚朴、菖蒲、日二貼。後以川芎、山梔、豆豉、瓜蒂、菉豆粉、薤汁、鹽湯吐之。吐甚快。不食。後以四君子湯服之。以當歸、酒芩、紅花、木通、粘子、蒼朮、姜南星、牛膝、茯苓爲末。酒糊丸。服十日後。夜間微汗。手足動而能言。

一、人癱左。

酒連　酒芩　酒柏　防風
羌活　川芎　當歸半兩。　南星
蒼朮　人參一兩。　麻黃　甘草三錢。
附子三片。

右丸如彈子大。酒化服。

一、人體肥中風。先吐。後以藥。

蒼朮　南星　酒芩
木通　茯苓　牛膝　酒柏
升麻　厚朴　甘草　紅花

〔附錄〕風者、百病之始。善行而數變。行者動也。風本爲熱。熱勝則風動。宜以靜勝其燥。養血是也。治須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衞。多下則損其榮。治其在經。雖有汗下之戒。而有中藏、中府之分。中府者宜汗之。中藏者宜下之。此雖合汗下。亦不可太過。汗多則亡陽。下多則亡陰。亡陽則損其形。初謂表裏不和。須汗下之。表裏已和。是宜治之在經。其中府者。面顯五色。有表證而脈浮。惡風惡寒。拘急不仁。或中身之後。身之前。身之側。皆曰中府也。其治多易。中藏者。唇吻不收。舌不轉。而失音。鼻不聞香臭。耳聾而眼昏。大小便秘結。或眼合直視。搖頭。口開。手撒。遺溺。痰如拽鋸。鼻鼾。皆曰中藏也。中藏者多不治也。六府不和。留結爲癰。五藏不和。九竅不通。無此乃在經也。初證既定。宜以大藥養之。當順時令而調陰陽。安藏府而和營衞。少有不愈者也。風中府者。先以加減續命湯隨證發其表。如兼中藏。則大便多秘澁。宜以三化湯通其滯。初證已定。別無他變。以大藥和治之。大抵中府者多著四肢。中藏者多滯九竅。中府者多兼中藏之證。至於舌强失音。久服大藥。能自愈也。又因氣中。其證與中風相似。但風中多痰涎。氣中口中無涎。治之之法。調氣爲先。經言治風者以理氣。氣順則痰消。徐理其風。庶可收效。又有中已言不變。志不亂。病在分腠之間者。只宜溫肝取解汗。爲可復也。　凡中風。脈多沉伏。

大法浮遲者吉。沉實者凶。先用麻油調蘇合香丸。或用姜汁。或用白湯調。如口噤。抉開灌之。稍醒則服八味順氣散。若痰盛者。只以省風導痰湯服之。若中則昏沉不省人事。口噤。急以生半夏末吹入鼻中。或用細辛皂角爲末吹之。噴嚏則甦。無嚏者不治。肥人中者。以其氣盛於外而歉於內也。肺爲氣出入之道。肥者氣必急。氣急必肺邪盛。肺金克木。膽爲肝之府。故痰涎壅盛。所以治之必先理氣爲急。中後氣未順。痰未除。調理之劑。惟當以藿香正氣散和星香散煎服。此藥非特可治中風之證。治中氣中惡尤宜。尋常止嘔多痰者。亦可用之。若前證多怒。宜小續命湯加羚羊角。熱而渴者。湯中去附子。加秦艽半錢。恍惚錯語。加茯神、遠志各半錢。不得睡。加酸棗仁半錢。不能言。加竹瀝一蜆殼許。人虛無力者。去麻黃。加人參如其數。若人自甦。能言能食。惟身體不遂。急則攣跣。緩則譫曳。經年不愈。以加減地仙丹常服。若飲食坐臥如常。但失音不語。只以小續命去附子。加菖蒲一錢。治風之法。初得之。即當順氣。及日久。即當活血。此萬古不易之至理。惟可以四物湯吞活絡丹愈者。正是此義。若先不順氣化痰。遽用烏、附、又不活血。徒用防風、天麻、羌活輩。吾未見能治也。又見風中於膚腠。輒用腦麝治之者。是引風入骨髓也。尤爲難治。深可戒哉。如口喎斜未正者。以蓽麻去殼。爛搗。右喎塗左。左喎塗右。或蟬魚血入麝香少許。塗之即正。㖞噦初卒倒。僵仆不知人事。急以皂角末。或不臥。散於鼻內。吹之。就提頭頂髮。立甦。若有噦者可治。無噦者不治。經曰。風從汗泄。似可微汗。正如解表。表實無汗者。散之刼之。表虛自汗者。溫之解之。若氣滯者難治。宜吐之。餘症見前。可下者。此因內有便溺之阻隔。

故裏實若三五日不大便者。可與機要三化湯。或子和搜風丸。老人只以潤腸丸。理氣者。氣滯氣鬱。肩膊麻痛之類。此七情也。宜烏藥順氣。八味順氣之類。理血者。無表裏之急。血弱舉發不時者。用大秦艽湯。或羌活愈風湯。兼用化痰丸子。灸可灸風池、百會、曲池、合谷、風市、絕骨、環跳、肩髃、三里等穴。皆灸之。以鑿竅疎風。

【附方】

二陳湯

半夏泡　陳皮二兩半　白茯苓兩半　甘草炙、七錢半

右㕮咀。每服四錢。水一盞。生姜七片。烏梅一箇。煎。

四君子湯　見脾胃類。

四物湯　見婦人類。

稀涎散　治中風忽然若醉。形體昏悶。四肢不收。涎潮搐搦。

猪牙皂角四條。去黑皮。　白礬一兩。

右爲末。每服三字。溫水灌下。但吐出涎便醒。虛人不可大吐。

通頂散　治中風中氣。昏憒不知人事。急用吹鼻卽甦。

藜蘆　生甘草　川芎　細辛

人參各一錢。

右爲末。吹入鼻中一字。就提頭頂中髮。立甦。有嚏者可治。

八味順氣散

白朮　白茯苓　青皮　白芷

陳皮去白。　台烏藥　人參各一兩。　甘草五錢。

每服五錢。水一鍾半。煎七分。溫服。仍以酒化蘇合香丸間服。

烏藥順氣散

麻黃　陳皮　台烏各二兩。

川芎　枳殼炒。　甘草炙。

桔梗各一兩。　乾姜炮。半兩。

右爲末。每服三錢。水二盞。生姜三片。棗一枚。煎服。

星香湯

南星八錢。　木香一錢。

分二服。水一鍾。姜十片。煎服。

省風湯　白殭蠶炒。

白芷　甘草五錢。

南星生八兩　防風四兩　獨活　附子生去皮臍

全蝎炒　甘草生各二兩

每服四錢水一鍾半生姜十片煎服

小省風湯　與導痰湯相合煎服導痰湯見痰類

防風　南星生各四兩　半夏米泔浸　黃芩

甘草生各二兩

每服四錢姜十片

小續命湯

麻黃去節　人參　黃芩　芎藭

川芎　甘草炙　杏仁炒去皮尖　防己

桂各一兩　防風一兩半　附子炮去皮臍半兩

每服五錢水一盞半姜五片棗一枚煎溫服取微汗隨人虛實與所中輕重加減于後若熱者去附子入白附子亦可　筋急拘攣語遲脈弦加苡薏仁　若筋急加人參去黃芩芎藭以避中寒服後稍輕再加當歸　煩燥不大便去附桂倍加芎藭竹瀝　如大便三五日不去胸中不快加只殼大黃

如言語蹇澁手足顫掉加菖蒲竹瀝　若發渴加麥冬葛根瓜蔞根　身體痛加羌活搐者亦加之

煩燥多驚者加犀角羚羊角汗多者去麻黃

家寶丹　治一切風疾癱瘓瘈瘲不仁口眼喎僻者邪入骨髓可服

川烏　輕粉各一兩　五靈脂姜汁製另研　草烏各六兩

南星　全蝎　沒藥　辰砂各二兩

白附子　乳香　殭蚕炒三兩　片腦五錢

羌活　麝香　地龍四兩　雄黃

天麻三兩

右爲末作散調三分不覺半錢或蜜丸如彈子大含化茶調皆可

如神救苦散　治癱瘓風濕痹走注疼痛不止此劫劑也非痛不可服痛止則已

米殼一兩去頂膜蜜炒　陳皮五錢　虎骨酥炙

乳香研　沒藥研　甘草各二錢半

右爲末每服三錢水一盞煎連渣服病在上食後在下食前煎時須順攪之

大秦艽湯　治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌强不能言語宜養血而筋自榮

秦艽　石膏各二兩　甘草　川芎

當歸　白芍　羌活　防風
黃芩　白芷　白朮　生苄
熟苄　茯苓　獨活各一兩　細辛
春夏加知母一兩.

右咬咀.每服一兩.水煎服.無時.如遇天陰.加生姜七片.心下痞.加枳實一錢.

三化湯　外有六經之形證.先以加減續命湯治之.若內有便溺之阻隔.以此湯主之.

厚朴　大黃　枳實　羌活等分.

每服三兩.水煎服.以利爲度.

〔附錄〕法曰.四肢不收舉.俗曰癱瘓.故經所謂太過則令人四肢不舉.又曰.上太過則敎皐.皐、高也.敎、厚也.既厚而又高.則令除去.此眞所謂膏粱之疾.非腎肝經虛.何以明之.經所謂三陽三陰發病.偏枯痿易.四肢不舉.三陰不足.則發偏枯.三陽有餘.則爲痿易.易爲變易.常用而痿弱無力也.其治則瀉.令氣弱.陽衰.土平.而愈.故以三化湯下之.若脾虛則不用也.經所謂土不及則卑陷.卑、下也.陷、坑也.故脾病四肢不用.四肢皆稟氣於胃.而不能至經.必因脾方可得稟受也.令脾不能與胃行其津液.四肢不得稟水穀氣.日以衰.脈道不利.筋骨肌肉皆無氣以生.故不用焉.其治可大補十全散.加減四物湯.去邪歸正.

愈風湯　中風症。內邪已除。外邪已盡。當服此藥。以行導諸經。久服大風悉去。縱有微邪。只從此藥加減治之。然治病之法。不可失於通塞。或一氣之微汗。或一旬之通利。如此乃常治之法也。久則清濁自分。營衛自和。如初覺風動。服此不至倒仆。

羌活　甘草炙　防風　防己
黃耆　蔓荊子　川芎　獨活
細辛　枳殼　麻黃去根　地骨皮
人參　知母　甘菊　薄荷去梗
白芷　枸杞子　當歸　杜仲炒
秦艽　柴胡　半夏　厚朴姜製
前胡　熟艽各二兩　白茯苓　黃芩三兩
生艽　蒼朮　石膏　芍藥各四兩

桂一兩

右剉。每服一兩。水二鍾。生姜三片。煎。空心一服。臨臥煎查。空心一服。吞下二丹丸。爲之重劑。臨臥一服。吞下四白丹。爲之輕劑。立其法。是動以安神。靜以清肺。假令一氣之微汗。用愈風湯三兩。加麻黃一兩。勻作四服。加生姜。空心服。以粥投之。得微汗則佳。如一旬之通利。用愈風湯三兩。加大黃一兩。

亦匀作四服。如前服。臨臥服。得利爲度。此藥常服之。不可失四時之輔。如望春大寒之後。本方中加半夏、人參、柴胡各二兩。通前四兩。謂迎而奪少陽之氣也。如望夏穀雨之後。本方中加石膏、黃芩、知母各二兩。謂迎而奪陽明之氣也。季夏之月。本方中加防己、白朮、茯苓各二兩。謂勝脾土之濕也。初秋大暑之後。本方中加厚朴一兩。藿香一兩。桂一兩。謂迎而奪太陰之氣也。望冬霜降之後。本方中加附子、官桂各一兩。當歸二兩。謂勝少陰之氣也。如得春氣候。減多所加。四時類此。此雖立四時加減。更宜臨病之際。審察虛實寒熱。土地之宜。邪氣多少。此藥具七情六欲四氣。無使五藏偏勝。及不動於榮衛。如風秘服之。永不結燥。此藥與天麻丸相爲表裏。治未病之聖藥也。若已病者。更宜常服。無問男女老幼。驚癇搐搦。急慢驚風。四時傷寒等病。服之神效。

四白丹　能清肺氣。養魄。謂中風者多昏冒。氣不清利也。

白朮　砂仁　白茯苓　香附
防風　川芎　甘草　人參各半兩。
白芷一兩。　羌活　獨活　薄荷各二錢半。
藿香　白檀香各一錢半。　知母　細辛各二錢。
甜竹葉二兩。　麝香一錢。另研。　龍腦另研。　牛黃各半錢另研。

右爲末。煉蜜丸。每兩作十丸。臨臥嚼一丸。分五七次細嚼之。煎愈風湯嚥下。能上清肺氣。下强骨髓。

二丹丸　治健忘養神、定志、和血、內以安神、外華腠理。

丹參　天門冬　熟芋各一兩半。　甘草

麥門冬　白茯苓各一兩。　人參　遠志

朱砂各半兩、研爲末。　菖蒲

右爲末、煉蜜丸、如梧桐子大、每服五十丸至百丸、空心食前煎愈風湯送下。

瀉清丸　治中風、自汗昏冒、發熱不惡寒、不風安臥、此是風熱煩燥之故也。

當歸　川芎　羌活

大黃　防風　龍膽草等分

右末、蜜丸彈子大、每藥一丸、竹葉湯化下。

天麻丸　治風因熱而生、熱勝則動、宜以靜勝其躁、是養血也。

天麻、　牛膝二味用酒同浸三日、焙乾、

元參各六兩。　杜仲炒、去絲、七兩。　附子炮、一兩。　萆薢　羌活十四兩。

川歸十兩。　生芋一斤。

一方有獨活五兩、去腎間風。

右爲末、蜜丸如梧桐子大、每服五七十丸、空心溫酒白湯皆可下。

藿香正氣散

大腹皮　茯苓　白芷　紫蘇各一兩。

陳皮　苦梗　白朮　厚朴

半夏曲　甘草各二兩。　藿香三兩。

右爲末。每服二錢。姜三片、棗一枚、煎服。

地仙丹

牛膝　蓯蓉　附子　川椒各四兩。

地龍　木鱉子各二兩。　覆盆子　白附子

兔絲子　赤豆　南星　骨碎補

羌活　何首烏　狗脊　萆薢

防風　烏藥各二兩。　白朮　甘草

白茯苓　川烏各一兩。　人參　黃耆各一兩半。

右爲末。酒糊丸。每服三四十丸。空心酒下。

活絡丹

南星炮。　川烏　草烏並炮。去皮尖。　地龍去土。各六兩。

乳香研　沒藥研各二兩二錢

右爲末酒糊丸桐子大每服二十丸空心日午冷酒下荆芥茶亦得

不臥散　子和方

川芎兩半　石膏七錢半　藜蘆五錢　甘草生二錢半

右爲細末口嚥水搐之

子和搜風丸

人參　茯苓　南星　薄荷各半兩

乾姜　寒水石　生白礬　蛤粉

黃芩　大黃各一兩　滑石　牽牛各四兩

藿香一分　半夏一兩

右爲末水丸如小豆大生姜湯下日三

潤腸丸

麻子仁另研　大黃酒煨各一兩半　桃仁泥　歸尾

枳實麩炒　白芍　升麻半兩　人參

生甘草　陳皮各三錢　木香　檳榔各二錢

右除麻仁、桃仁外、爲末、却入二仁泥、蜜丸梧子大、每服七八十丸、溫水食前下。

中寒二　附傷寒傷風

主乎溫散　有卒中天地之寒氣者、有口得寒物者、

○從補中益氣湯加發散藥屬內傷者十居八九、其法、邪之所湊、其氣必虛、只用前湯中、從所見之證、出入加減、必先用參耆托住正氣、氣虛甚者、少加附子、以行參耆之劑、如果氣虛者、方可用此法、胃氣大虛、必當溫散、理中湯相宜、甚者加附子、倉卒感受大寒之氣、其病卽發、非若傷寒之邪、循經以漸而深也、已上治法、宜用於南不宜北、

戴云、此傷寒、謂身受肅殺之氣、口傷生冷物之類、因胃氣大虛、膚腠疎豁、病者脈必沉細、手足厥冷、息微身倦、雖身熱亦不渴、倦言動者是也、宜急溫之、遲則不救矣、與熱證若相似而實不同、凡脈數者、或飲水者、煩燥動搖者、皆熱病、寒熱二證、若水火然、不可得而同治、誤卽殺人、

〔附錄〕凡症與傷寒相類者極多、皆雜證也、其詳出內經熱論、自長沙以下、諸家推明甚至、千世之下、能得其粹者、東垣也、其曰內傷極多、外傷間而有之、此發前人之所未發、後人狥俗、不能眞切、雷同指爲外傷、極謬、其或可者、蓋亦因其不敢放肆而多用和解及平和之藥散之爾、若粗率者、則必殺人、初有感冒等輕證、不可便認作傷寒妄治、西北二方、極寒肅殺之地、故外感甚多、東南二方、溫和之地、外傷極少、雜病亦有六經所見之證、故世俗混而難別、

正治溫散。宜桂枝湯、四逆湯輩。甚者三建湯霹靂散。從治用熱藥加涼劑引之。或熱藥須俟冷飲最妙。經曰。從而逆之。此之謂也。反攻用煎鳥頭之類。

○傷能屬肺者多。宜辛溫或辛涼之劑散之。戴云。新咳嗽鼻塞聲重者是也。

【附方】

補中益氣湯　見內傷類。

理中湯

人參　甘草　乾姜　白朮等分。

右剉。每服五錢。水煎溫服。

桂枝湯

桂枝　赤芍各一兩半。　甘草一兩。　生姜一兩半。

大棗

右剉。每服五錢。水煎溫服。

四逆湯

甘草炙二兩。　乾姜一兩半。　附子半兩。

右剉。每服五錢。水煎溫服。

三建湯

大川烏　附子　天雄並炮等分

右剉。每四錢。水二盞。姜十五片煎服。

霹靂散

附子一枚及半兩者。炮熟取出。用冷灰培之。細研。入眞臙茶一大錢同和。分二服。每服水一盞。煎六分。臨熟入蜜半匙。放溫服之。

姜附湯　治中寒身體强直。口噤不語。逆冷。

乾姜一兩。　附子生去皮臍一斤。

右剉。每服三錢。水煎服。　挾氣攻刺。加木香半錢。　挾氣不仁。加防風一錢。　挾濕者加白朮。　筋脈牽急加木瓜。　肢節痛加桂二錢。

消風百解散

荊芥　白芷　陳皮　麻黃

蒼朮　甘草等分。

右剉。用姜三片。葱白三根。水煎服。

神朮散　治傷風頭痛。鼻塞聲重。方見痢類。

中暑三　附暑風注夏

暑證。用黃連香薷飲。挾痰。加半夏、南星。虛加人參、黃耆。暑病內傷者。用淸暑益氣湯。蓄暑氣是痰。用吐。注夏屬陰虛。元氣不足。夏初春末。頭疼脚軟。食少體熱者。是宜補中益氣湯。去柴胡、升麻、加炒柏、白芍藥。挾痰者。加南星、半夏、陳皮。煎服。又或用生脈湯。暑氣挾痰。挾火實者。可用吐法。

暑乃夏月炎暑也。盛熱之氣者火也。有冒、有傷、有中三者。有輕重之分。虛實之辨。或腹痛水瀉者。胃與大腸受之。惡心者。胃口有痰飲也。此二者冒暑也。可用黃連香薷飲。淸暑益氣湯。蓋黃連退暑熱。香薷消畜水。或身熱頭疼。燥亂不寧者。或身如針刺者。此爲熱傷在分內也。當以解毒湯。白虎湯。加柴胡。氣如虛者。加人參。或咳嗽發寒熱。盜汗出不止。脈數者。熱在肺經。用淸肺湯。柴胡天水散之類。急治則可。遲則不救。成火乘金也。此爲中暑。凡治病。須要明白辨別。愼勿混同施治。春秋間亦或有之。切冀執一隨病處方爲妙。

戴云。暑風者。夏月卒倒。不省人事者是也。有因火者。有因痰者。火、君相二火也。暑、天地二火也。內外合而炎爍。所以卒倒也。痰者、人身之痰飲也。因暑氣入而鼓激痰飲。塞碍心之竅道。則手足不知動蹈而卒倒也。此二者。皆可吐。內經曰。火鬱則發之。吐卽發散也。量其虛實而吐之。吐醒後。可用淸劑調治之。

【入方】

暑渴

生芐　麥冬　牛膝　炒柏
知母　葛根　甘草

右剉。水煎服。

〔附錄〕中暍是陽證。中暑是陰證。脈沉弱者。切不可用寒涼藥。清熱宜天水散。五苓白虎湯皆可。熱悶恍惚。辰砂五苓散。脈弦實。黃連香茹湯。熱甚自汗而渴。便澁者。五苓分利之。或桂苓甘露飲。吐瀉。脈沉微甚者。可用附子大順散。伏熱傷冷。縮脾飲、冷香飲子、皆可。浸冷服之。或剁蒜肉入鼻中。或研蒜水解灌之。蓋蒜氣臭烈。能通諸竅故也。

【附方】

生脈湯

人參　麥冬　五味子

右剉。水煎服。

黃龍丸　治一切暑毒。

赤亮雄黃五錢。　硫黃　硝石各一兩。　滑石

明礬各半兩。　好麵四兩。

右爲末丸梧子大每服五七十丸白湯下

卻暑散　治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄痢煩渴背寒面垢

赤茯苓　生草各四兩　寒食麵　生姜各一斤

右爲末每服二錢白湯調下

香薷飲　治傷暑藏府不和調霍亂吐利煩渴引飲

白扁豆炒　川朴姜製八兩　香茹一斤

右水煎入酒少許沉冷服

黃連香薷飲

香薷一斤　川朴製半斤　黃連

右咬咀每二三錢水煎服

大順散

甘草斷寸長三兩　乾姜　杏仁　桂四兩

右將甘草用白沙炒黃次入乾姜同炒令姜裂次入杏仁同炒不作聲爲度篩去沙入桂爲末每服二三錢水煎溫服如煩燥井花水調服以沸湯點服亦得

十味香薷飲

香薷一兩.　人參　陳皮
茯苓　黃耆　木瓜
扁豆　甘草炙.各半兩.

右爲末.每二錢.熱湯或冷水調服.咬咀煎亦得.

清暑益氣湯　治長夏濕熱蒸人.人感之.四肢困倦.精神少.懶於動作.胸滿氣促.支節疼.或氣高而喘.身熱而煩.心下膨閉.小便黃而數.大便溏而頻.或痢或渴.不思飲食.自汗體虛.

黃耆　蒼朮剉.　升麻各一錢.　人參
白朮　神曲　陳皮各半錢.　甘草炙.
酒柏　麥冬　當歸各三分.　葛根二分.
五味子九箇.　澤瀉五分.　青皮二分半.

右咬咀.作一服.水二大盞.煎至一盞.去渣.大溫服.食遠.

補中益氣湯　見內傷類.

天水散

滑石六兩.　甘草炙.一兩.

右爲極細末.水調服.

五苓散

白朮　猪苓　茯苓各一兩半　桂一兩

澤瀉二兩半加辰砂名辰砂五苓散

人參白虎湯　治暑熱發渴脈虛

人參一錢半　知母二錢　石膏半兩　甘草一錢

右咬咀入粳米一合水煎服

桂苓甘露飲　宣明方

茯苓　澤瀉各一兩　石膏

活石四兩　白朮　桂

右爲末每服三錢白湯調下

縮脾飲　解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

砂仁　草果　烏梅肉

扁豆炒　葛根各一兩　甘草炙各四兩

右咬咀每服四錢水煎冷服

冷香飲子　治傷暑渴霍亂腹痛煩躁脈沉微或伏

寒水石各二兩　猪苓各半兩

草果仁三兩.　附子　陳皮各一兩.　甘草半兩.

右㕮咀.每服一兩.入姜煎.水旋冷服.

黃連解毒湯

黃連　黃柏　黃芩　梔子等分.

右㕮咀.水煎.

中濕四

本草云.蒼朮治濕.上下部皆可用.二陳湯中加酒芩、羌活、蒼朮.散風行濕.脾胃受濕.沉困無力.怠惰好臥.去痰須用白朮.上部濕.蒼朮功烈.下部濕.宜升麻提之.外濕宜表散.內濕宜淡滲.若燥濕.以羌活勝濕湯、平胃散之類.若風濕相搏.一身盡痛.以黃耆防己湯.若濕勝氣實者.以神佑丸、舟車丸服之.氣虛者.桑皮、茯苓、人參、蓽撥、木香之類.凡肥人沉困怠惰.是濕熱.宜蒼朮、茯苓、滑石.凡肥白之人.沉困怠惰.是氣虛.宜二朮、人參、半夏、草果、厚朴、芍藥.凡黑瘦而沉困怠惰者.是熱.宜白朮、黃芩.凡飲食不節.脾胃受傷.不能遞送.宜枳朮丸.去上焦濕及熱.須用黃芩.瀉肺火.故也.又如肺有濕.亦宜黃芩.如肺有虛熱.宜天門冬、麥門冬、知母.用黃芩多則損脾.去中焦濕與痛熱.用黃連.瀉心火.故也.如中焦有實熱.亦宜黃連.若脾胃虛弱.不能運轉而鬱悶.宜黃芩、白朮、乾葛.若中焦濕熱.積久而痛.乃熱勢甚盛.宜黃連.用姜汁炒.去下焦濕腫及痛.併膀胱有火邪者.必須酒洗防己、黃柏、知母、草龍膽.又

云。凡下焦有濕。草龍膽、防己爲君。甘草、黃柏爲佐。如下焦腫及痛者。是濕熱。宜酒防己、草龍膽、黃芩、蒼朮。若肥人氣虛之人。腫痛。宜二朮、南星、滑石、茯苓。黑瘦之人。下焦腫痛。宜當歸、桃仁、紅花、牛膝、檳榔、黃柏。

戴云。濕有自外入者。有自內出者。必審其方土之致病源。東南地下。多陰雨。地濕。凡受必從外入。多自下起。以重腿脚氣者多。治當汗散。久者宜疎通滲泄。西北地高。人多食生冷、濕麵、湩酪。或飲酒後寒氣怫鬱。濕不能越。以致腹皮脹痛。甚則水鼓脹滿。或通身浮腫。按之如泥不起。此皆自內而出也。辨其元氣多少。而通利其二便。責其根在內也。此方土內外。亦互相有之。但多少不同。須對證施治。不可執一。

【附方】

二陳湯　見中風類。

羌活勝濕湯

羌活　獨活各一錢。　藁本　防風

甘草炙　川芎各五分。　蔓荊子三分。

右㕮咀。作一服。水二盞。煎至一盞。去渣。大溫服。空心。

如身重腰沉沉然。加酒洗防己五分。輕者附子五分。重者川烏五分。

平胃散　見厥類。

防己黃耆湯　治風溫脈浮身重汗出惡風或痛

防己一兩　甘草炙半兩　白朮七錢半　黃耆一兩一錢

右㕮咀每服一兩入姜棗煎喘者加麻黃胃氣不利加芍藥氣上衝加桂枝下有寒加細辛

三花神佑丸　治一切水濕腫病大腹實脹喘滿

輕粉一錢　大黃一兩爲末　牽牛二兩　芫花醋拌炒

甘遂　大戟各半兩

右爲末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下無時日三

舟車丸

大黃二兩　甘遂　大戟　芫花

青皮　陳皮各一兩　牽牛頭末四兩　木香半兩

右爲末水丸如梧子大每服六七十丸白湯下隨證加減

枳朮丸　見內傷類

升陽除溫湯　見泄瀉類

瘟疫五　附大頭天行病

瘟疫衆人一般病者是又謂之天行時疫治有三法宜補宜散宜降熱甚者加童便三酒中

【入方】

大黃　黃連　黃芩　人參

桔梗　防風　蒼朮　滑石

香附　人中黃

右爲末神曲糊丸每服六七十丸分氣血與痰作湯使　氣虛者四君子湯　血虛者四物湯　痰多者二陳湯送下熱甚者童便下

又方溫病亦治食積痰熱降陰火

人中黃

飯爲丸綠豆大下十五丸

又時病

半夏　川芎　茯苓　陳皮

山查　白朮　蒼朮君　甘草

如頭痛加酒芩口渴加乾葛身痛加羌活薄桂防風芎藥

大頭天行病此爲濕氣在高顛之上切勿用降藥

東垣有方

羌活　酒黃芩　酒蒸大黃

附方治大頭病兼治喉痹歌。

人間治疫有仙方。一兩殭蚕二大黃。

姜汁爲丸如彈子。井花調蜜便清涼。

冬溫爲病。非其時而有其氣也。冬時嚴寒。當君子閉藏。而反發泄於外。專用補藥而帶表藥。如補中益氣之類。

作人中黃法

以竹筒兩頭留節。中作一竅。內甘草於中。仍以竹木釘閉竅。於大糞缸中浸一月。取出晒乾。大治疫毒。

左手脈大於右手。浮緩而盛。按之無力。大病虛脫。本是陰虛用艾灸丹田者。所以補陽。陽生陰長故也。不可用附子。止可多服人參。

【附方】

漏蘆湯　治藏府積熱。發爲腫毒。時疫疙瘩。頭面洪腫。咽嗌塡塞。水藥不下。一切危惡疫癘。

漏蘆　升麻　大黃　黃芩

藍葉　元參等分。

右咬咀。每服二錢。水煎服。腫熱甚加芒硝二錢。

消毒丸　治時疫疙瘩惡證。

大黃　牡蠣　殭蠶炒。等分。

右爲末。煉蜜丸如彈子大。新水化一丸。內加桔梗、大力子尤妙。

潔古雄黃丸　辟時疾。可與病人同床。傳著衣服。亦不相染。

雄黃一兩。研。　赤小豆炒。　丹參　鬼箭羽各二兩。

右爲細末。蜜丸。每服五丸。空心溫水下。

火六

火。陰虛火動難治。火鬱當發。看何經。輕者可降。重者則從其性而升之。實火可瀉。黃連解毒之類。虛火可補。小便降火極速。凡氣有餘。便是火。不足者是氣虛。火急甚重者。必緩之以生甘草。兼瀉兼緩。參朮亦可。人壯氣實火盛顛狂者。可用正治。或硝黃冰水之類。人虛火盛狂者。以生姜湯與之。若投冰水正治。立死。有補陰卽火自降。炒黃柏生地黃之類。凡火盛者。不可驟用涼藥。必兼溫散。可發有二風寒外來者可發。鬱者可發。氣從左邊起者。乃肝火也。氣從劑下起者。乃陰火也。氣從脚起入腹如火者。乃虛之極也。蓋火起於九泉之下。多死。一法用附子末津調。塞湧泉穴。以四物湯加降火藥服之妙。陰虛證本難治。用四物湯加炒黃柏。降火補陰。龜板補陰。乃陰中之至陰也。四物加白馬脛骨。降陰中火。可代黃連黃芩。黃連黃芩梔子、大黃黃柏。降火非陰中之火不可用。生甘草

緩火邪。木通下行。瀉小腸火。　人中白瀉肝火。須風露中二三年者。　人中黃大涼。治疫病須多年者佳。中氣不足者。味用甘寒。　山梔子仁。大能降火。從小便泄去。其性能屈曲下降。人所不知。亦治痞塊。中火邪。

【入方】

左金丸　治肝火。　一名回令丸。

黃連六兩。一本作芩。　吳茱萸一兩或半兩。

右爲末。水丸或蒸餅丸。白湯五十丸。

〔附錄〕諸熱瞀瘈。暴瘖口噤。卒暴強直。皆屬於風。諸轉反戾。水液渾濁。皆屬於熱。諸痿喘呕。皆屬於上。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。諸痙項強。皆屬於濕。諸風掉眩。皆屬於肝。諸病胕腫。疼酸。氣逆衝上。禁慄如喪神守。嘔呕。瘡瘍。喉痹。耳鳴及聾。嘔涌溢。食不下。目昧不明。暴注。瞤瘈。暴瘍。暴死。五志七情過極。皆屬火也。　火者有曰君火、人火也。曰相火、天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動皆屬火。以名而言。形質相生。配於五行。故謂之君。以位而言。生於虛無。守位稟命。因動而見。故謂之相。腎肝之陰。悉其相火。東垣曰。相火元氣之賊。火與元氣不相兩立。一勝則一負。然則如之何則可使之無勝負乎。周子曰。神發知矣。五性感動而萬事出。有知之後。五者之性。爲物所感。不能不動。謂之動者。卽內經五火也。相火易起。五性厥陽之火相扇。則妄動矣。火起於妄。變化莫測。無時不有。煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與熱言之。相火之氣。經以火言之。蓋表其暴悍酷烈。有甚於君火者也。故曰。相火元氣之賊。周子又曰。聖人

定之以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉此善處乎火者人心聽命於道心而又能主之以靜彼五火將寂然不作而相火者惟有俾補造化而爲生生不息之運用爾何賊之有

【附方】

東垣瀉陰火升陽湯　治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

羌活　甘草炙　黃耆　蒼朮各一兩

升麻八錢　柴胡兩半　人參　黃芩各七錢

黃連酒炒半兩　石膏半兩秋深不用

右㕮咀每服一兩或半兩水煎　此藥發脾胃火邪又心膽肝肺膀胱藥也瀉陰火升發陽氣榮養氣血者也

升陽散火湯　治男子婦人四肢發熱肌熱筋痹熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻　葛根　獨活　羌活各半兩

防風二錢半　柴胡八錢　甘草炙三錢　人參

白芍各半兩　甘草生二錢

右㕮咀。每服半兩或一兩。水煎稍熱服。

地骨皮散　治渾身壯熱。脈長而滑。陽毒火熾。發渴。

地骨皮　茯苓各半兩。　柴胡

生艾　知母各一兩。　石膏二兩。

麻黃各七錢半。有汗並去之。　黃芩

右㕮咀。每服一兩。入姜煎。　羌活

黃連解毒湯　見暑類。

丹溪先生心法卷二

斑疹七

斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下　內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降於陰證略例中求之發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理　疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者　疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之　癮疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癮疹也發則多痒或不仁者是兼風兼溫之殊色紅者兼火化也　黃瓜水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出卽收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

〔附錄〕斑疹之病其爲證各異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹　又傷寒陽證發斑有四惟溫毒發斑至重紅赤者爲胃熱也紫黑者爲胃爛也一則下早一則下之晚乃外感熱病發斑也以玄參升麻白虎等藥服之　陰證發斑亦出背胸又出手足亦稀少而微紅若作熱證投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胸中上獨薰肺傳於皮膚而爲斑點但如蚊蚋虱蚤咬形狀而非錦紋也只宜調中溫胃加以茴香芍藥或以大建中之類

其火自下。斑自消退。可謂治本而不治標也。

【入方】

調中湯　治內傷外感而發陰斑。

蒼朮一錢半　陳皮一錢。
芍藥炒。　甘草炙
白芷　羌活
麻黃　桂枝各半錢。

右㕮咀。姜三片。水煎服。

消毒犀角飲子　治斑及癮疹。

牛旁子六錢。　荊芥
砂仁　藿香
桔梗　半夏
枳殼各一錢。　川芎半錢。
麻黃　防風各三錢。
黃芩　甘草一錢。
荊芥　薄荷
石膏
梔子

右㕮咀。水煎。

通聖散　出丹溪經驗方。

川芎　當歸
連翹　白芍
桔梗一兩。　滑石三兩。

白朮二錢半　　甘草

右剉。水煎服。如身疼。加蒼朮、羌活。痰嗽。加半夏。每服細末三錢。生姜三片。擂細盪起。煎沸服之。

玄參升麻湯　瘥在身治汗下、吐後、毒不散。表虛裏實。發於外。甚則煩燥譫妄。

玄參　　升麻　　甘草等分。

右咬咀。水煎。

化斑湯　治傷寒汗吐下後。斑發。脈虛。

白虎湯加人參。守眞再加白朮。

右咬咀。時時煎服。

大建中湯

黃芪　　當歸　　桂心　　芍藥各二錢。

人參　　甘草各一錢。　　半夏　　黑附炮。去皮。各二錢半。

右咬咀。每服五錢。水二盞。姜三片。棗二枚。煎。食前服。

瘧八

瘧疾有風。暑。食。痰。老瘧。瘧母。六法。風暑當發汗。夏月多在風涼處歇。遂閉其汗而不泄故也。惡飲食者。必自飲食上得之。無汗者要有汗。散邪爲主。帶補。有汗者。要無汗。正氣爲主。帶散。

一日一發者受病一月　間日一發者受病半年　三日一發者受病一年　二日連發住一日者氣血俱病　瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服　久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮白朮一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截　老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎　撫芎　紅花　當歸
炒柏　白朮　蒼朮　甘草
白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

充案瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而爲補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截瘧常山飲

穿山甲炮　草果　知母　檳榔

烏梅　甘草炙　常山

右咬咀。水酒一大碗。煎半碗。露一宿。臨發日早服。得吐爲順。一云加半夏、柴胡。去穿山甲。如吐、加厚朴。又或加青皮、陳皮。

又方

柴胡　草果　常山　知母

貝母　檳榔

右用酒水同煎。露一宿。臨發前二時服。

又治瘧母。此藥消導。

青皮　桃仁　紅花

麥芽　鼈甲醋炙爲君、　三稜　莪朮

海粉　香附並用醋炙。

右爲末。丸如梧子大。每服五七十丸。白湯下。

又治瘧。寒熱頭痛如破。渴飲冰水。外多汗出。

人參　白朮　黃芪　神麴　黃芩

黃連　山梔　川芎　蒼朮

半夏　天花粉

右㕮咀。水二鍾。姜三片。煎服。

又治瘧病發渴。

生芣　麥門冬　牛膝

知母　葛根　炒柏　生甘草

右㕮咀。水煎。

截瘧青蒿丸

青蒿半斤　冬瓜葉　官桂　馬鞭草

右焙乾爲末。水丸胡椒大。每一兩分四服。於當發之前一時服盡。又云。高蒿一兩。冬青落二兩。馬鞭草二兩。桂二兩。未知孰是。姑兩存之。以竢知者。

截瘧

檳榔　陳皮　白朮　常山三錢。

茯苓　烏梅　厚朴各一錢半。

右㕮咀。作二服。水酒各一鍾。煎至一鍾。當發前一日一服。臨發日早一服。服後少睡片時。

又瘧疾後

白朮　半夏一兩　黃連半兩　白芍三錢
陳皮半兩

右爲末粥丸梧子大每服六十丸姜湯下

〔附錄〕世用砒霜等毒不可輕用俗謂脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒況其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅爲主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言是但三陰經說不明作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

○瘧脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脈極虛微而無力似乎不弦然而必於虛微之中見弦但不搏手耳細察可見也

○瘧又名痁疾蓄其證不一素問又有五臟瘧六腑瘧詳矣初得病勢正熾一二發間未宜遽截不問寒熱多少且用清脾飲或草果飲或二陳湯加草果半錢或平胃加草果半錢柴胡半錢又或養胃湯加川芎、草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯服後寒仍多者養胃湯加附子、桂枝各半錢獨寒尤宜不效則七棗湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚者則以五苓散入辰砂少許獨熱無寒亦與小柴胡湯熱雖劇不甚渴者本方加桂四分或以柴胡桂姜湯候可截則截之　久瘧毋不愈者宜四獸飲間服山甲湯

【附方】

清脾湯

青皮　厚朴　草果
柴胡　茯苓　半夏
甘草炙等分

右剉水二盞生姜三片棗一枚煎忌生冷油膩

七棗湯

附子一箇炮又以鹽水浸再炮如此七次去皮臍又方川烏代附子以水調陳壁土爲糊浸七次

右剉分作二服水二鍾姜七片棗七枚煎七分當發日早溫服

驅瘧飲

前胡　柴胡各四兩　桂心
厚朴　半夏各三兩　黃芪
甘草炙各二兩

右剉水二盞生姜三片棗四箇煎

桔梗
乾姜炮

山甲湯

川山甲　　木鱉子等分。

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。

人參　白朮　茯苓　甘草減半。

陳皮　草果　半夏　栗子

烏梅　生姜等分。

右剉同姜棗。以鹽少許。淹食頃。厚皮紙裹以水潤濕。慢火煨。令香熟焙乾。每服半兩水濕。未發前併進數服。

○有汗要無汗。正氣爲主。小柴胡加桂。或白虎加桂。○無汗要有汗。散邪爲主。帶補。桂枝加黃芪。知母。石膏湯。或人參柴胡飮子。熱多寒少。目痛多汗。脈大。以大柴胡湯。微利爲度。餘邪未盡。以白芷石膏三物湯。以盡其邪。

六和湯

人參　知母　草果　貝母

烏梅　白芷　檳榔　柴胡各一錢。用酒拌。

常山二錢。

右剉。水煎。姜三片。棗一箇。

祕方清脾丸　治瘧三日一發或十日一發

姜黃三錢　白朮一兩半　人參　檳榔

草果　薑朮醋炒　厚朴各半兩　黃芩

半夏　青皮各一兩　甘草三錢

右爲末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服

紅丸子　消食瘧

胡椒一兩　阿魏一錢醋化　薑朮　三稜醋煮一伏時各二兩

青皮炒二兩

右爲末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸梧子大炒土硃爲衣每服七十丸姜湯下

二陳湯　見中風類

草果飲子

草果　川芎　紫蘇葉　白芷

良姜　炙甘草　青皮去白炒　陳皮去白

右等分爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服留渣兩服併一服當發日進三服不以時

人參養胃湯

平胃散加人參、茯苓半夏、草果、藿香、生姜、烏梅。

參蘇飲

陳皮去白。　枳殼麩炒。　桔梗　甘草炙。
木香各半兩。　半夏　乾葛　蘇葉
前胡　人參　茯苓各七錢半。一方不用木香。

右剉。每服五錢。水盞半。生姜七片。棗一箇。煎微熱服。

五苓散　見中暑類。

柴胡桂姜湯

柴胡八兩。　桂枝　黃芩各三兩。
牡礪二兩。　甘草炙二兩。　乾薑二兩。　括蔞根四兩。

右剉。水煎。日三服。煩汗出愈。

小柴胡湯

柴胡八兩。　黃芩　人參　甘草炙。各三兩。
半夏三兩。

右剉。每五錢。水盞半。生薑五片。棗一枚。煎服。不拘時。

白虎加桂枝湯　治溫瘧。

知母六兩。　甘草炙二兩。　石膏四兩碎。　桂枝一兩。

粳米六合。

右剉。水煎。日三汗出愈。

小柴胡加桂湯

本方去人參、加桂一兩。

桂枝加黃芪知母石膏湯

本方加黃芪、知母、石膏、各四錢半。

大柴胡湯

柴胡八兩。　黃芩　赤芍各三兩。　枳實半兩。麩炒。　大黃二兩。

半夏二兩半。

右剉。每五錢。水盞半。生薑五片。棗一枚。煎服。無時。

白芷石膏三物湯

白芷一兩。　知母一兩七錢。　石膏四兩。

右爲粗末。每半兩。水一盞半。煎一盞。溫服。

痢九

痢赤屬血。白屬氣。有身熱。後重。腹痛。下血。身熱挾外感。小柴胡湯去人參。後重積與氣墜下之故。兼升兼消。宜木香檳榔丸之類。不愈者。用秦艽、皂角子、煨大黃、當歸、桃仁、黃連、枳殼。若大腸風盛。可作丸服。保和丸亦治因積作後重者。五日後不可下。蓋脾胃虛故也。後重窘迫者。當和氣。木香檳榔。腹痛者。肺金之氣鬱在大腸之間。如實者。以劉氏之法下之。虛則以苦梗開之。然後用治痢藥。氣用氣藥。血用血藥。有熱用黃芩芍藥之類。無熱腹痛。或用溫藥薑桂之屬。下血四物爲主。下血多主食積與熱。或用朴硝者。青六丸治血痢效。痢疾初得一二日間。以利爲法。切不可便用止澁之劑。苦實者。調胃承氣。大小承氣。三乙承氣下之。有熱先退熱。然後看其氣病血疾。加減用藥。不可便服參朮。然氣虛者可用。胃虛者亦用之。血痢久不愈者。屬陰虛。四物湯爲主。涼血和血。當歸、桃仁之屬。下痢久不止。發熱者。屬陰虛。用寒涼藥。必兼升散藥。併熱藥下。痢大孔痛者。因熱流於下也。以木香檳榔黃連黃芩炒乾薑。噤口痢者。胃口熱甚故也。大虛大熱。用香連丸。蓮肉各一半。共分末。米湯調下。又方。人參二分。薑炒黃連一分。爲末。濃煎。終日細細呷之。如吐則再服。但一呷下咽便開。人不知此。多用溫熱藥甘味。此以火濟火。以滯益滯。封臍引熱下行。用田螺肉搗碎。入麝香少許。盦臍內。下痢不治之證。下如魚腦者。半死半生。下如塵腐色者死。下純血者死。下如屋漏水者死。下如竹筒注者不治。赤痢乃自小腸來。白痢乃自大腸來。皆濕熱爲本。赤白滯濁同法。下痢有風邪下陷。宜升提之。蓋風傷肝。肝主木故也。

有濕傷血宜行濕清熱。內經所謂身熱則死寒則生。此是大概言。必兼證詳之方可。今豈無身熱而生寒而死者。脈沉小留連或微者易治。洪大數者難治也。脈宜滑大不宜弦急。仲景治痢可溫者五法。可下者十治。或解表或利小便或待其自已。還分易治難治不治之證。至爲詳密。但與瀉同立論不分。學者當辨之。大孔痛一曰溫之一曰清之。按久病身冷脈沉小者宜溫。暴病身服脈浮洪者宜清宜補。有可吐者亦有可汗可下者。初得之時元氣未虛。必推蕩之。此通因通用之法。稍久氣虛則不可下。壯實初病宜下虛弱衰老久病宜升之。先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈。先膿血勝水瀉此腎傳脾微邪易愈。下痢如豆汁者濕也。蓋脾腎爲水穀之海無物不受。常兼四藏。故五色之相雜。當先通利。此迎而專之之義。如虛者亦宜審之。因熱而作不可用巴豆。如傷冷物者或可用。宜謹。又有時疫作痢一方一家之內上下傳染相似。却宜明逆氣之勝復以治之。

戴云痢雖有赤白二色。終無寒熱之分。通作濕熱治。但分新舊。更量元氣用藥。與赤白帶同。

【入方】

黃連　滑石　生芐　白芍

蒼朮　白朮　當歸　青皮

條芩

右剉。水煎。裏急後重。炒連、滑石、加桃仁、檳榔、甚者大黃。嘔者用薑汁、半夏。

又方

乾薑一錢.　當歸二錢半.　烏梅三箇.
黃連一錢.　黃柏一錢半.

右剉作一服.水煎.食前.若水瀉.可等分用.或加枳殼.

又方　治熱與血.

大黃　黃連　黃芩
枳殼　當歸　芍藥
桃仁　甘草　白朮等分.

右爲末.或湯調.或作丸.用麵糊.或神麴糊.丸服.
一本云.誤服熱藥澁藥毒犯胃者.當明審以祛其毒.

治白痢

蒼朮　白朮　神麴
地楡　甘草　茯苓

右剉水煎.

治赤痢

地黃　芍藥　黃柏　地楡　白朮

右剉水煎。腹痛加枳殼、厚朴。後重加滑石、木香、檳榔。有熱加黃芩、山梔。

又治痢方

滑石一兩。　蒼朮半兩。　川芎三錢。　桃仁活法用。

芍藥半兩炒。　甘草一錢。

右爲末。薑一片擂細煎滾服。

又方　孫郎中因飲水過多。腹脹瀉痢。帶白。

蒼朮　白朮　厚朴　茯苓

滑石

右咬咀。水煎。下保和丸。　又云加炒麵、甘草。

又方　痢後腳弱漸細者。

蒼朮　酒芩　白芍各二兩半。　酒柏炒半兩。

右爲末。粥丸。以四物湯加陳皮、甘草、水煎送下。

又方　痢後腰痛。兩腳無力。

陳皮　半夏　白芍各一錢　茯苓
蒼朮　當歸　酒芩各半錢　白朮
甘草各二錢
右㕮咀作一服薑煎食前
又方　治小兒八歲下痢純血作食積治
蒼朮　白朮　黃芩　滑石
白芍　茯苓　甘草　陳皮
神曲炒
右㕮咀水煎下保和丸
治痢十法
其或惡寒發熱身首俱痛此爲表證宜微汗和解用蒼朮、川芎、陳皮、芍藥、甘草、生薑三片煎　其或腹痛後重小水短下積此爲裏證宜和中疏氣用炒枳殼、製厚朴、芍藥陳皮、滑石、甘草煎　其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此爲死血證法當用搗細桃仁、滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱即加黃芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪是名挾寒即加乾薑　其或下墜在血活之後此氣滯證宜於前藥加檳榔一枚　其或在下則纏住在上則嘔食此爲毒積未化胃氣未平證當認其寒則溫之熱則清之

虛則用參朮補。毒解積下。食自進。其或力倦自覺氣少惡食。此爲挾虛證。宜加白朮、當歸身。虛甚者加人參。又十分重者。止用此一條。加陳皮補之。虛回而利自止。其或氣行血和積少。但虛坐努責。此爲無血證。倍用當歸身尾、却以生芍藥、生芐、生桃仁佐之。復以陳皮和之。血生自安。其或纏墜退減十之七八。穢積已盡。糟粕未實。當炒芍藥、炒白朮、炙甘草、陳皮、茯苓、煎湯下固腸丸三十粒。然固腸丸性燥。恐尙有滯氣未盡行者。但當單飮此湯。固腸丸未宜進用。蓋固腸丸有去濕實腸之功。其或利後。糟粕未實。或食粥稍多。或飢甚方食。腹中作痛。切不可驚恐。當以白朮、陳皮各半煎湯和之。自安。其或久痢後。體虛氣弱滑下不止。又當以藥澁之。可用訶子肉、豆蔻、白礬、半夏。甚者添牡礪。可擇用之。然須用陳皮爲佐。恐大澁亦能作痛。又甚者。炙天樞氣海。右前方用厚朴專瀉滯凝之氣。然厚朴性大溫而散氣。久服大能虛人。滯氣稍行。卽去之。餘滯未盡。則用炒枳殼、陳皮。然枳殼亦能耗氣。比之朴稍緩。比陳皮稍重。滯氣稍退。當去之。只用陳皮以和衆藥。然陳皮去白有補瀉之功。若爲參朮之佐。亦純作補藥用。凡痢疾腹痛。必以白芍藥、甘草爲君。當歸、白朮爲佐。惡寒痛者加桂。惡熱痛者加黃柏。達者更能參以歲氣時令用藥。則萬舉萬全。豈在乎執方而已哉。

〔附錄〕痢有氣虛兼寒熱。有食積。有風邪。有熱有濕。有陽氣下陷。而感受不一。當分治。瀉輕痢重。諸有積以肚熱纏痛推之。諸有氣以肚如蟹渤驗之。究其受病之源。決之對病之劑。大要以散風邪。行滯氣。開胃脘爲先。不可遽用肉豆蔻、訶子、白朮輩以補住寒邪。不可投米殼、龍骨輩以閉澁腸胃。邪得補而

愈盛。故證變作。所以日夕淹延而未已也。若升散者。以胃風湯。防風芍藥湯。神朮散。蒼朮防風湯。敗毒散。皆可汗之。攻裏若有濕者。用導水丸。兼鬱承氣湯。和中丸。若積滯用聖餅子。脾積丸。冷積用局方蘇感丸。若濕熱甚者。宜宣明玄青膏。若後重窘迫。用木香檳榔丸。色白者屬氣。赤白者屬氣血受病。赤黑相兼屬濕熱。青綠雜色是風與火濕。下血者。當涼血。當歸、生苄。赤者屬血。保命集四物湯。和槐花、黃連、米殼醋炒。下利。脈沉弱而腹痛。用薑附湯。加對五苓理中。又機要漿水散。若青色者。寒兼風。若陽氣下陷者。以升陽益胃湯。加桔梗醋炒南星。用梅葉外貼眉攢。極效。起泡便止。下痢若濕盛勝濕者。以平胃散對五苓散最可。或麵苓丸。老人奉養大過。飲食傷脾。爲脾泄。機要白朮芍藥湯。濕勝。仙朮炒用。若陰陽不分。當滲泄以五苓之類。或單用茯苓實炒爲末。米飲調二錢。若氣血俱虛。神弱者。以人參、白朮、當歸、芍藥、炒茯苓、少加黃連服之。或錢氏白朮散。又或十補湯佳。若暑痢而脈虛者。香薷飲。或清暑益氣。又或六和湯。藿香正氣。各加木香半錢。名木香交加散。若白痢下如凍膠。或鼻涕。此屬冷痢。宜除濕湯。加木香一錢。虛弱者亦與十補湯。赤痢發熱者。以敗毒散。加陳倉米一撮煎。下痢小便不通者。黃連阿膠丸爲最。

【附方】

胃風湯　治風冷入於腸胃。泄下鮮血。或腸胃濕毒。下如豆汁或瘀血。

人參　茯苓　川芎　當歸

桂　白芍　白芍等分。

右剉。水煎。入粟米百餘粒同煎。腹痛加木香。

噤口痢

石蓮肉白乾。

右爲末。服二錢。陳倉米湯調下。便覺思食。使以日照東方壁土炒眞橘皮爲末。薑棗略煎佐之。

戴人木香檳榔丸

木香　檳榔　青皮　陳皮

廣朮　枳殼　黃連　黃柏

大黃各半兩。　丑末　香附各二兩。

右爲末。木丸梧子大。每五六十丸。煎水下。量虛實與之。○紺珠多三稜、黃芩、當歸。分兩不同。

調胃承氣陽

芒硝半斤。　甘草炙。二兩。　大黃四兩。去皮酒洗。

右剉。每服臨期斟酌多少。先煮二味熟。去查。下硝。上火煮二三沸。頓服之。

大承氣湯

大黃四兩。如棋子大。酒洗。　厚朴八兩。薑制。　枳實大者五枚炒。

芒硝二合.

每服看證斟酌多少.先煮二物至七分.去查.內大黃.煮八分.去查.內芒硝.煎一二沸.溫服.

小承氣湯

大黃四兩. 厚朴二兩.薑炒. 枳實大者三枚.炒.

右剉.看證斟酌多少用之.

防風芍藥湯

防風 芍藥 黃芩各二兩.

右咬咀.每服半兩.水煎服.清.

神朮散

蒼朮一斤. 藁本 川芎各六兩. 羌活四兩.

粉草 細辛一兩六錢.

右爲粗末.每服三錢.薑三片.煎.要出汗.加葱白.

蒼朮防風湯

蒼朮二兩. 防風一兩.

薑七片.煎.

敗毒散

羌活　獨活　人參　甘草炙。
柴胡　前胡　茯苓　枳殼麩炒
川芎　桔梗等分。

右剉。每服四錢。水一盞。薑三片。薄荷五葉煎。熱服。寒多則熱服。熱多則溫服。傷濕加白朮。腳痛加天麻。

神芎導水丸

大黃　黃芩二兩。　丑末　滑石四兩。

右爲末。滴水丸。每四五十丸。溫水下。

和中丸

白朮二兩四錢。　厚朴二兩。　陳皮一兩六錢。　半夏泡一兩。
檳榔五錢。　枳實五錢。　甘草四錢。　木香二錢。

右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸。每三十丸。溫水下。食遠。

聖餅子

黃丹二錢。　定粉三錢。　密陀僧二錢。　舶上硫黃一錢。
輕粉少許。

右爲細末。入白麵四錢。滴水和爲指尖大。捻作餅子。陰乾。食前漿水磨化服之。大便黑色爲妙。

蘇感丸

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟米大。每五丸。淡薑湯空心下。

宣明玄青膏

黃連　黃柏　大黃　甘遂

芫花醋拌炒。　大戟各半兩。　丑頭末二兩。　輕粉二錢。

青黛一兩。

右爲末。水丸小豆大。初服十丸。每服加十丸。日三。以快利爲度。

保命集四物湯

本方內加槐花、黃連、御米殼等分。

薑附湯

理中湯　並見中寒類。

五苓散　見中暑類。

漿水散

半夏一兩湯洗。　附子半兩炮。　乾薑一作乾生薑。　桂

甘草炙各五錢。　良薑二錢半。

右爲細末。每服三五錢。漿水二盞。煎至半盞。和滓熱服。

升陽益胃湯

羌活　獨活　防風各半兩。

白朮　茯苓湯勿用。　澤瀉各三錢。

人參　半夏　甘草炙各一兩。

陳皮四錢。　白芍五錢。

右㕮咀。每服三錢。水煎。入薑棗溫服。

麴蘗丸

川芎　神麴　白朮　附子炮等分。

右爲細末。麵糊丸梧子大。每服三五十丸。溫米飲下。此藥亦治飧泄。

機要白朮芍藥湯

白朮　芍藥各一兩。　甘草五錢。

右剉。每服一兩。水煎。

錢氏白朮散

人參　白茯苓　白朮　木香
甘草　藿香各一兩.　乾薑
右爲粗末.水煎.
香薷飮
清暑益氣湯　並見中暑類.
六和湯　見霍亂類.或加香薷.厚朴.
藿香正氣散　見中風泥.
黃連阿膠丸
阿膠炒.二兩.　黃連三兩.　茯苓二兩.
右水熬阿膠膏.溲和二末爲丸.米飮下.
固腸丸　見婦人類.
除濕湯　見泄瀉類.
十全大補湯　見諸虛類.
泄瀉十
泄瀉.有濕、火、氣虛、痰積.濕用四苓散.加蒼木.甚者蒼白二朮同加.炒用燥濕兼滲泄.火用

四苓散加木通、黃芩，伐火利小水。痰積宜豁之。用海粉、青黛、黃芩、神麯、糊丸服之。在上者用吐提。在下陷者宜升提之。用升麻、防風。氣虛用人參、白朮、炒芍藥、升麻。食積二陳湯和澤瀉、蒼朮、白朮、山查、神麯、川芎，或吞保和丸。瀉水多者，仍用五苓散。久病大腸氣泄，用熟地黃半兩，炒白芍、知母各三錢，升麻、乾薑各二錢，炙甘草一錢，爲末，粥丸服之。仍用艾炷如麥粒，於百會穴灸三壯。脾瀉當補脾氣，健運復常。用炒白朮四兩，炒神麯三兩，炒芍藥三兩半。冬月及春初用肉蔻代之。或散或湯，作餅子尤佳。食積作瀉，宜再下之。神麯、大黃作丸子服。脾泄已久，大腸不禁，此脾已脫，宜急澁之，以赤石脂、肉豆蔻、乾薑之類。

戴云：凡瀉水腹不痛者是濕。飲食入胃不住，或完穀不化者是氣虛。腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣是火。或瀉時或不瀉，或多或少是痰。腹痛甚而瀉，瀉後痛減者是食積。

【入方】

一老人奉養太過，飲食傷脾，常常泄瀉，亦是脾泄。

黃芩炒半兩。　白朮炒二兩。　白芍酒拌炒。　半夏各一兩泡。
神麯炒。　山查炒，各一兩半。

右爲末，青荷葉包飯燒熟，研丸如梧子大，食前白湯下。

一老人年七十，面白，脈弦數，獨胃脈沉滑，因飲白酒作痢，下血淡膿水，腹痛，小便不利，裏急後重，參、朮爲

君、甘草、滑石、檳榔、木香、蒼朮爲佐、下保和丸二十五丸、第二日前證俱減、獨小便不利、以益元散與之、安、

治痛泄

炒白朮三兩、　炒芍藥二兩、　炒陳皮兩半、　防風一兩、

久瀉加升麻六錢、

右剉分八貼、水煎或丸服、

止瀉方薑麵丸

隔年陳麥麵作麵二兩、炒、又一兩、　茴香五錢、

右爲末、或丸、每服五七錢、白湯下、

又方

肉豆蔻五兩、　滑石夏二兩半、秋二兩、春冬一兩二錢半、　生薑二兩、又一兩、

右爲末、飯丸、或水調服、

清六丸　去三焦濕熱、治泄瀉多與清化丸同用、並不單用、兼治產後腹痛或自利者、能補脾補血、亦治血痢、

六一散一料、　紅曲炒半兩、活血、又云二兩半、

右爲末飯丸梧子大每五七十丸白湯下

又方　治泄瀉或嘔吐

右以六一散生薑汁入湯調服

〔附錄〕寒泄寒氣在腹攻刺作痛洞下清水腹內雷鳴米飲不化者理中湯或吞大巳寒丸宜附子桂香丸畏食者八味湯　熱瀉糞巴赤黃肛門焦痛糞出穀道猶如湯澆煩渴小便不利宜五苓散吞香連丸　濕瀉由坐臥濕處以致濕氣傷脾土不克水梅雨久陰多有此病宜除濕湯吞戊己丸佐以胃苓湯重者朮附湯　傷食瀉因飲食過多有傷脾氣逐成泄瀉其人必噫氣如敗卵臭宜治中湯加砂仁半錢或吞感應丸尤當　有脾氣久虛不受飲食者食畢即腸鳴腹急盡下所食物纔方寬快不食則無事俗名錄食瀉經年不愈宜快脾丸三五粒　因傷於酒每晨起必瀉者宜理中湯加乾葛或吞酒煮黃連丸　因傷麵而瀉者養胃湯加蘿蔔子炒研破一錢痛者更加木香半錢瀉甚者去藿香加炮薑半錢　有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效米飲下五味丸或專以五味子煎飲亦治脾腎瀉雖省即飲食忌口但得日間上半夜無事近五更其瀉復作此病在腎俗呼爲脾腎瀉分水飲下二神丸及椒朴丸或平胃散下小茴香丸病久而重其人虛甚宜椒附湯　暑瀉因中暑熱者宜胃苓湯或五苓散加車前子末少許甚效　世俗類用澁藥治痢與瀉若積久而虛者或可行之初得之者必變他疾爲禍不小殊不知多因於濕惟分利小水最爲上策

【附方】

四苓散 卽五苓散內去桂。

五苓散 益元散 並見中暑類。

理中湯 見中寒類。

大已寒丸

芷撥 肉桂各四兩。 乾薑炮。 高良薑各六兩。

右爲末。水煮麵糊丸梧子大。每三十丸。空心米飲吞下。

八味湯

吳茱萸湯洗七次。 乾薑炮。各二兩。 陳皮

肉桂 丁香 人參

右剉。每四錢。水一盞。煎七分。溫服。

香連丸

黃連去鬚十兩。用吳茱萸五兩同炒赤色。去茱萸不用。 木香

當歸洗焙。各一兩。

右爲末。醋糊丸梧子大。每二十丸。空心米飲下。

升陽除濕湯 木香二兩四錢。不見火。

升麻　柴胡　防風　神麯
澤瀉　猪苓各半兩　蒼朮一兩　陳皮
甘草炙　大麥蘗麵各三錢

右作一服水煎飯後熱服○胃寒腸鳴加益智仁半夏各半錢薑棗煎非腸鳴不用

戊己丸　治胃經受熱泄痢不止

黃連　吳茱萸去梗炒　白芍各五兩

右爲末麵糊丸梧子大每三十丸米飲下

胃苓湯　夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散　平胃散

右合和薑棗煎空心服

朮附湯　和劑

甘草二兩炙　白朮四兩　附子炮一兩半

右剉每服三錢薑五片棗一枚煎空心服

治中湯　見脾胃類

感應丸　出寶鑑

木香　肉豆蔻　丁香各一兩半　乾薑炮一兩

巴豆七十箇去皮心膜研出油　杏仁百四箇湯浸去皮尖研

右前四味爲末外入百草霜二兩研與巴豆杏仁七味同和勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去粗更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出待酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用春夏修合用清油一兩銚內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋六修合用清油一兩半同煎煮熟成汁和勻藥末成劑分作小鋌子油紙裹旋丸服之每三十丸空心薑湯下

保和丸　見積聚類

酒蒸黃連丸

黃連半斤淨酒二升浸以瓦器置甑上蒸至爛取出晒乾

右爲末滴水丸每五十丸食前溫水下

養胃湯　見瘧類

五味子散　治腎泄

五味子二兩　吳茱萸半兩細□綠色者

右二味炒香熟爲度細末每服二錢陳米飲下有一親識每五更初曉時必瀉泄一次此名腎瀉服此愈

椒附丸微義。

椒紅炒。　桑螵蛸炙。　龍骨　山茱萸取肉

附子炮。　鹿茸酒蒸焙。

右爲末酒糊丸、每六十空心。

二神丸

破故紙炒四兩。　肉豆蔻二兩生。

右爲末以大肥棗四十九箇生薑四兩切同煮棗爛去薑取棗肉研膏入藥和丸每五十丸鹽湯下。

燥結十一

○燥結血少不能潤澤理宜養陰。

【入方】治大腸虛秘而熱。

白芍一兩半。　陳皮　生苄　歸身一兩。

條芩　甘草二錢。

右爲末粥丸白湯下七八十丸。

〔附錄〕凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸所以司出而不納也今停蓄蘊結獨不得疎導何哉抑有由矣邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸挾熱然也虛入臟冷而血脈

枯。老人臟塞而氣道澁。此大腸之挾冷然也。亦有腸胃受風。涸燥秘澁。此證以風氣蓄而得之。若夫氣不下降而穀道難噫。逆泛滿。必有其證矣。

東垣諸論。原附於此。今節不錄。觀者宜於東垣書中求之。

【附方】理宜節去。姑存以便閱者。

導滯通幽湯　治大便難。幽門不通。上衝吸門不開。噎塞不便。燥秘。氣不得下。治在幽門。以辛潤之。

歸身　升麻　桃仁泥各一錢。　生芐

熟芐各半錢。　甘草炙。　紅花各三分。

右作一服。水煎。食前調檳榔末半錢。或加麻仁泥一錢。○加大黃。名當歸潤燥湯。

潤燥湯

升麻　生芐各二錢。　歸梢　生甘草

大黃煨。　熟芐　桃仁泥　麻仁各一錢。

紅花半錢。

右除桃仁、麻仁另研。作一服。水煎。次下桃仁、麻仁煎。空心熱服。

活血潤燥丸　治大便風秘血秘。常常燥結。

歸梢一錢。　防風三錢。　大黃紙裹煨。　羌活各一兩。

桃仁二兩研如泥　麻仁二兩五錢研　皂角仁燒存性一兩五錢其性得溫則滑溫滑則燥結自通

右除二仁另研外餘爲末後和勻蜜丸梧子大空心服五十丸白湯送下三兩服後以蘇子麻子粥每日早晚食之大便不致結燥以磁器盛之紙封無令見風

半硫丸　治冷秘風秘結老人秘

透明硫黃研　半夏洗七次等分

右爲末生薑糊丸梧子大服二十丸薑湯下或用一葱白一條薑三片煎入阿膠二片溶開食前空心送下

麻仁丸　治大便秘風秘脾約

郁李仁　麻子仁各六兩另研　大黃二兩半以一半炒

山藥　防風　枳殼炒七錢半　檳榔五錢

羌活　木香各五錢半

右爲末蜜丸梧子大服七十丸白湯下

脾約丸

麻仁一兩一錢半研　枳實　厚朴　芍藥各二兩

大黃四兩蒸　杏仁去皮麩炒一兩二錢研

右爲末煉蜜丸梧子大服三五十丸溫水下

○凡諸秘服藥不通或兼他證又或老弱虛極不可用藥者用蜜熬入皂角末少許作□以導之冷秘生薑□亦佳

霍亂十二

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰不降垂隔而成切莫與穀食雖米飲一呷入口卽死必待吐瀉過二三時直至饑甚方可與稀粥食之脈多伏欲絕　見成吐瀉不徹還用吐提其氣起不透或用樟木煎湯吐之亦可　大法生薑理中湯最好不渴者可用如渴者用五花散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者　轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也　轉筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩、紅花、蒼朮、南星、煎服　乾霍亂者最難治死在須臾升降不通當以吐提其氣極是良法世多用鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜二陳湯加解散藥

二陳湯加　川芎　蒼朮　防風　白芷又云白朮

右剉薑五片煎服

治霍亂方

蒼朮　厚朴　陳皮　葛根各一錢半
滑石三錢　白朮二錢　木重一錢　甘草炙

右剉。入薑煎湯。下保和丸四五十丸。

戴云。霍亂者。吐也。有聲有物。凡有聲無物而躁亂者。謂之乾霍亂也。

〔附錄〕霍亂之候。揮霍變亂。起於倉卒。多因夾食傷寒。陰陽乖隔。上吐下利。而燥擾痛悶。是其候也。偏陽則多熱。偏陰則寒。卒然而來。危甚風燭。其濕霍亂死者少。乾霍亂死者多。蓋以所傷之物。或因吐利而盡泄出則止。故死者少也。夫上不得吐。下不得利。所傷之物。擁閉正氣。關格陰陽。其死者多。霍亂熱多而渴者。五苓散。寒多而不飲水者。理中湯。或有寒腹滿而痛。四肢拘急。轉筋下利者。以理中湯加生附子、官桂。中暑霍亂煩燥大渴。心腹撮痛。四肢冷。冷汗出。脚轉筋。用霍香散。千金云。轉筋者。用理中湯加火煅石膏。若霍亂吐瀉。心腹疙痛。先以鹽湯探吐。後服霍香正氣。加木香半錢。若頻欲登圊不通者。更加枳殼一錢。人於夏月多食瓜果。多飲冷乘風。以致食留不化。因食成痞。隔絕上下。遂成霍亂。以六和湯倍加霍香煎服。皆要藥也。

【附方】

六和湯

砂仁　半夏　杏仁　人參

甘草炙各一兩　赤茯苓　藿香　扁豆炒
木瓜各二兩
右剉每服五錢水二鍾生薑三片棗一箇煎溫服一本有香蘇厚朴各四兩
二陳湯　見中風
五苓散　見中暑
理中湯　見中寒
藿香正氣散　見中風
通脈四逆湯　治霍亂多寒身冷脈絕
吳茱萸二兩炒　附子炮一兩
細辛　白芍
右咀每四錢水酒各半加生薑煎
木瓜湯　治霍亂吐下舉體轉筋入腹則悶絕
乾木瓜一兩　吳茱萸半兩　桂心　通草
甘草炙各半兩　當歸二錢　茴香　炙甘草各一錢
右咀每服四大錢薑三片蘇十葉煎
痰十三

○脈浮當吐。久得脈濇。卒難開也。必費調理。大凡治痰用利藥過多。致脾氣虛。則痰易生而多。濕痰用蒼朮、白朮。熱痰用青黛、黃連、芩。食積痰用神麴、麥芽、山查。風痰用南星。老痰用海石、半夏。瓜蔞香附五倍子作丸服。痰在膈上。必用吐法。瀉亦不能去。風痰多見奇證。濕痰多見倦怠軟弱。氣實痰熱結在上者。吐難得出。痰清者屬寒。二陳湯之類。膠固稠濁者。必用吐。熱痰挾風。外證爲多。熱者清之。食積者。必用攻之。兼氣虛者。用補氣藥送。痰因火盛逆上者。以致火爲先。白朮、黃芩、軟石膏之類。內傷挾痰。必用參、芪、白朮之屬。多用薑汁傳送。或加半夏。虛甚加竹瀝。中氣不足。加參、朮。痰之爲物。隨氣升降。無處不到。脾虛者。宜清中氣。以運痰降下。二陳湯加白朮之類。兼用升麻提起。中焦有痰。則食積胃氣亦賴所養。卒不便虛。若攻之盡。則虛矣。痰成塊或吐咯不出。兼氣鬱者。難治。氣濕痰熱者難治。痰在腸胃間者。可下而愈。在經絡中、非吐不可。吐法中就有發散之義焉。假如癇病因驚而得。驚則神出舍。舍空則痰生也。血氣入在舍而拒其神。不能歸焉。血傷必用薑汁傳送。黃芩治熱痰。假其下火也。竹瀝滑痰。非薑汁不能行經絡。五倍子能治老痰。佐他藥大治頑痰。二陳湯一身之痰都治管。如要下行。加引下藥。在上加引上藥。凡用吐藥。宜升提其氣。便吐也。如防風、山梔、川芎、桔梗、芽茶、生薑、蘿汁之類。或用瓜蒂散。凡風痰病。必用風痰藥。如白附子、天麻、雄黃、牛黃、片芩、薑蠶、猪牙皂角之類。諸吐法另具于後。

○凡人身上中下有塊者。多是痰。問其平日好食何物。吐下後方爲藥。許學士用蒼朮治痰成窠囊一

邊行極妙。痰挾瘀血遂成窠囊。眩運嘈雜。乃火動其痰。用二陳湯加山梔子、黃連、黃芩之類。噫氣吞酸。此食鬱有熱。火氣上動。以黃芩爲君。南星、半夏爲臣。橘紅爲使。熱多加青黛。痰在脇下。非白芥子不能達。痰在皮裏膜外。非薑汁竹瀝不可導達。痰在四肢。非竹瀝不開。痰結核在咽喉中。燥不能出。入用化痰藥加鹹藥軟堅之味。瓜蔞仁、杏仁、海石、桔梗連翹少佐朴硝。以薑汁蜜和丸噙服之。海粉即海石。熱痰能降。濕痰能燥。結痰能軟。頑痰能消。可入丸子末子。不可入煎藥。枳實瀉痰。能衝墻壁。小胃丹治高上痰。熱風痰。濕痰。肩膊諸痛。能損胃氣。食積痰實者用之。不宜多。

○喉中有物咯不出。嚥不下。此是老痰。重者吐之。輕者用瓜蔞、薤。氣實必用荊瀝。天花粉大能降高上熱痰。痰在膈間。使人顛狂。或健忘。或風痰。皆用竹瀝。亦能養血。與荊瀝同功。治稍重。能食者用此二味效速穩當。二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡中痰。必佐以薑汁。韭汁治血滯不行。中焦有飲。自然汁冷。噢兩三銀盞。必胸中煩燥不寧。後愈。參萸丸能消痰。

【入方】

青礞石丸　解食積。去濕痰。重在風化硝。

南星二兩。切作片。用白礬末五錢。水浸一二日晒乾。又云一兩。

半夏一兩。湯泡。切作片。以皂角水浸一日晒乾。

茯苓　枳實炒。各一兩。　黃芩薑汁炒。

看虛實作湯使。

又方　治濕痰喘急止心痛。

半夏一味不拘多少香油炒。

右爲末粥丸梧子大每服三五十丸薑湯下。

又方

黃芩　香附　半夏薑制。　貝母

已上治濕痰加瓜蔞仁青黛作丸子治熱痰。

又方　燥濕痰亦治白濁因痰者。

南星　半夏各一兩。　蛤粉二兩。

右爲末神麴糊丸如梧子大青黛爲衣每服五十丸薑湯下。○濕痰加蒼朮。食積痰加神麴、麥芽、山查。熱加青黛。

中和丸　治濕痰氣熱。

蒼朮　黃芩　半夏　香附等分。

右爲末粥丸梧子大每服五七十丸薑湯下。

又方　治痰嗽。

黃芩酒洗一兩半　貝母　南星各一兩　滑石
白芥子去殼各半兩　風化硝二錢半取其輕浮速降
右爲末湯泡蒸餅丸服

導痰湯

法製硝同柴胡水煮化去蔴綿濾今結入臘月牛胆內風化秤五錢或只風化硝亦可又云一兩
礞石二兩搥碎焰硝二兩同入小砂鑵內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟晒乾火煅紅候冷取出
右爲末神麴糊丸梧子大每服三五十丸白湯下○一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使

一本礞石南星各一兩無枳實

又方

半夏二兩　白朮一兩　茯苓七錢半　黃芩
礞石一兩　風化硝二錢
右爲末同前

潤下丸　降痰甚妙

南星一兩　半夏二兩各依橘紅製　黃芩

黃連各一兩。　橘紅半斤。以水化鹽五錢。拌令得所。煮乾焙燥。
甘草炙一兩。
右爲末。蒸麥丸如菉豆大。每服五七十丸。白湯下。○一方單用陳皮半斤。鹽半兩。水拌。煮陳皮。候乾焙燥爲末。入甘草末一兩。炊餅同上丸。亦好。去胸高有痰。兼嗽。上熱加青黛。有濕加蒼朮。或加參萸。

南星炮一兩。　橘紅去白一兩。　赤茯苓去皮一兩。　枳殼去穰麩炒一兩。
甘草炙半兩。又云一兩。　半夏四兩。又云四錢。
右水煎。生薑五片。食前服。

千緡湯　治喘。

半夏七箇泡製。每箇作四片。　皂角去皮炙一寸。　甘草炙一寸。
右咀。作一服。生薑如指大。煎。

小胃丹

芫花好醋拌勻。過一宿瓦器。不住手攪。炒令黑。不要爆

甘遂濕麵裹。長流水浸半日。再水洗晒乾。又云。水浸冬七。春秋五日。或水煮亦可。

大戟長流水煮一時。再水洗晒乾。各半兩。

大黃濕紙裹煨。勿焦。切焙乾。再酒潤炒。熟焙乾。一兩半。　黃柏三兩焙炒

右爲末，粥丸麻子大。每服二三十丸，臨臥津液吞下。或白湯一口送下。取其高上之濕痰熱積，以意消息之。欲利則空心服。○又方甘遂大戟減三分之一，朱砂爲衣，名辰砂化痰丸。○一方加木香檳榔各半兩，蒸餅丸，每服七八丸至十丸止。

治酒痰

青黛　瓜蔞

右爲末，薑蜜丸噙化，救肺。

治鬱痰

白殭蠶　杏仁　瓜蔞仁　訶子

貝母　五倍子

右爲末，糊糊梧子大。每服五十丸，白湯下。

導痰丸

吳茱萸三錢，制。　茯苓一兩。　黃連半兩。　滑石七錢半。

蒼朮泔浸，一兩。

右爲末，糊丸梧子大。每服八九十丸，薑湯下。

茯苓丸出千金方，百一選方同。

半夏四兩　茯苓二兩　枳殼一兩

右爲末蒸餅或神曲薑汁糊丸糊子大每服三十丸薑湯下

風化硝半兩

又方　治食積痰火幷瀉胃火

軟石骨不拘多少研細

右用醋糊丸如菉豆大每服二十丸白湯下

又方　治陰虛內多食積痰

川芎七錢　黃連　瓜蔞仁

神麴　麥芽各一兩　青黛半兩

人中白三錢

右爲末薑汁蒸餅丸服

白朮

久吐痰喘

杏仁去皮尖生用

來復丹炒

右等分爲末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸

半夏一兩半　黃連一兩

吳茱萸湯洗一錢半

桃仁二十四箇研　陳皮半兩

右爲末麵糊丸菉豆大每服一百丸薑湯送下

白玉丸

巴豆三十箇去油　南星　半夏　滑石

輕粉各三錢

右爲末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸薑湯下

黃瓜蔞丸　治食積痰壅滯喘急

瓜蔞仁　半夏　山查　神麴炒各等分

右爲末瓜蔞水丸薑湯竹瀝送下二三十丸

又方

瓜蔞仁　半夏一兩　蒼朮二兩　香附二兩半

黃芩　黃連半兩

又方

瓜蔞仁　黃連半兩　半夏一兩

右爲末糊丸梧子大服五十丸

抑痰丸

瓜蔞仁一兩.　半夏二錢.　貝母三錢.

右爲末.蒸餅丸如麻子大.服一百丸.薑湯下.

清膈化痰丸

黃連　黃芩一兩.　黃柏　山梔半兩.

香附一兩半.　蒼朮二兩.

右爲末.蒸餅丸.白湯下.

搜風化痰丸

人參　槐角子　殭蠶　白礬

陳皮去白.　天麻　荆芥各一兩.　半夏四兩.薑汁炒.

辰砂半兩.另研.

右爲末.薑汁浸蒸餅爲丸.辰砂爲衣.服四十丸.薑湯下.

墜痰丸　治痰飲.

黑丑頭末二兩.　枳實炒.一兩半.　白礬三錢.枯一半.

枳殼一兩半炒.　猪牙皂角二錢酒炒.　朴硝二錢.風化.

右爲末。用蘿蔔汁丸。每服五十丸。雞鳴時服。初則有糞。次則有痰。

治濕痰

蒼朮三錢。　白朮六錢。　香附一錢半。

右爲末。蒸餅丸服。

治肥人濕痰

苦參　半夏各錢半。　白朮二錢半。　陳皮一錢。

右咀。作一服。薑三片。竹瀝半盞。水煎食遠。吞三補丸十五丸。

祛風痰行濁氣

明礬一兩。　防風二兩。　川芎　猪牙皂角

麝金各一兩。　蜈蚣二條。用赤脚黃脚各一條。

右爲末。蒸餅丸梧子大。每服三十丸。食前茶湯下。春以芭蕉湯探吐痰。

上焦風痰

瓜蔞　黃連　半夏　牙皂

薑汁浸。炊餅丸。

痰氣方

片芩炒　半夏半兩　白朮　白芍一兩

茯苓　陳皮三錢

右爲末蒸餅泡薑汁丸服

利膈化痰丸

南星　蛤粉研細一兩　半夏　瓜蔞仁

貝母去心治胸膈痰氣最妙　香附半兩童便浸

右爲末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角擂杏仁如泥入前藥搜和再入薑汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛爲衣每服五十丸薑湯下

清痰丸　專清中管熱痰積

烏梅　枯礬　黃芩　蒼朮

陳皮　滑石炒　青皮　枳實各半兩

南星　半夏　神麯炒　山查

乾生薑　香附各一兩

右爲末湯浸蒸餅丸服

〔附錄〕凡痰之爲患爲喘爲欬爲嘔爲利爲眩爲暈心嘈雜怔忡驚悸爲寒熱痛腫爲痞隔爲壅塞或

胸脇間轆轆有聲。或背心一片常爲冰冷。或四肢麻痺不仁。皆痰飲所致。善治痰者不治痰而治氣。氣順則一身之津液。亦隨氣而順矣。又嚴氏云。人之氣道貴乎順。順則津液流通。決無痰飲之患。古方治痰飲用汗吐下溫之法。愚見不若以順氣爲先。分導次之。又王隱君論云。痰清白者爲寒。黃而濁者爲熱。殊不知始則清白。久則黃濁。清白稀□。漬於上。黃濁稠粘。凝於下。嗽而易出者。清而白也。欬而不能出。則黃濁結滯也。若咯唾日久。濕熱所鬱。上下凝結。皆無清白者也。甚至帶血。血敗則黑。痰爲關格異病。人所不識。又清白者氣味淡。日久者。漸成惡味。酸辣腥臊焦苦不一。百病中多有兼痰者。世所不知也。凡人身中有結核。不痛不紅。不作膿者。皆痰注也。治痰法。實脾土。燥脾濕。是治其本也。

【附方】

二陳湯　見中風。　瓜蒂散　見疸。

三補丸　見虛損。　參萸丸　見祕方。

青金丸　蒼莎丸　並見咳嗽。

充按丹溪治病。以痰爲重。諸病多因痰而生。故前諸方。間有別出者。亦其平日常用。故不另開於附錄。觀者詳焉。

哮喘十四

○哮喘必用薄滋味。專主於痰。宜大吐。藥中多用醋。不用涼藥。須常帶表散。此寒包熱也。亦有虛而不可

吐者。一法用二陳湯加蒼朮黃芩作湯。下小胃丹。看虛實用。

【入方】治寒包熱而喘。

半夏　枳殼炒　桔梗　片芩炒
紫蘇　麻黃　杏仁　甘草

右水煎服。○天寒加桂枝。

治哮治積方

用雞子一箇。略敲殼損膜不損。浸尿缸內三四日。夜取出。煮熟喫之。效。蓋雞子能去風痰。

紫金丹　治哮。須三年後可用。

用精猪肉二十兩。一作三十兩。切作骰子塊。用信一兩。明者研極細末。拌在肉上。令勻。分作六分。用紙筋黃泥包之。用火烘。令泥乾。却用白炭火於無人處煅。青烟出盡爲度。取放地上一宿。出火毒。研細。以湯浸蒸餅丸如蒸豆大。食前茶湯下。大人二十丸。小人七八丸。量大小虛實與之。

喘十五

○喘病。氣虛。陰虛。有痰。凡久喘之證。未發宜扶正氣爲主。已發用攻邪爲主。氣虛短氣而喘。甚不可用苦寒之藥。火氣盛故也。宜導痰湯加千緡湯。有痰亦短氣而喘。陰虛自小腹下火起衝於上喘者。宜降心火補陰。有火炎者。宜降心火清肺金。有痰者。用降痰下氣爲主。上氣喘而躁者爲肺

服欲作風水證宜發汗則愈有喘急風痰上逆者大全方千緡湯佳或導痰湯加千緡湯有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火諸喘不止者用劫藥一二服則止劫之後因痰治痰因火治火劫藥以椒目研極細末一二錢生薑湯調下止之氣虛不用又法蘿蔔子蒸熟爲君皂角燒灰等分爲末生薑汁煉蜜丸如小豆子大服五七十丸嚥化止之氣虛者用人參蜜炙黃柏麥門冬地骨之類氣實人因服黃芪過多而喘者用三拗湯以瀉氣若喘者須用阿膠若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子補之若新病氣實而發喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩擷項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大概胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘卽止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而安

【入方】

痰喘方

南星　半夏　杏仁　瓜蔞子

香附　陳皮去白　皂角炭　蘿蔔子

右爲末神麯糊丸每服六七十丸薑湯下

又方

蘿蔔子蒸半兩　皂角半兩　海粉一兩　南星一兩

白礬一錢半　薑汁浸晒乾

右用瓜蔞仁薑蜜丸噙化

劫喘藥

好銅青研細　銀丹少許　炒轉色

右爲末每服半錢醋調空心服

〔附錄〕肺以清陽上升之氣居五臟之上通榮衛合陰陽升降往來無過不及六淫七情之所感傷飽食動作臟氣不和呼吸之息不得宣暢而爲喘急亦有脾腎俱虛體弱之人皆能發喘又或調攝失宜爲風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而爲喘又因痰氣皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣則驅散之氣鬱卽調順之脾腎虛者溫理之又當於各類而求凡此證脈滑而手足溫者生脈濇而四肢寒者死　風傷寒者必上氣急不得臥喉中有聲或聲不出以三拗湯、華蓋散、九寶湯、神祕湯皆可選用　若痰喘以四磨湯或蘇子降氣湯　若虛喘脈微色青黑四肢厥小便多以活人書五味子湯或四磨湯治嗽與喘用五味子爲多但五味有南北若生津止渴潤肺益腎治勞嗽宜用北五味若風邪在肺宜用南五味

【附方】

分氣紫蘇飲　治脾胃不和氣逆喘促

五味　桑白皮　茯苓　甘草炙

草果　腹皮　陳皮　桔梗各等分

紫蘇減半

右每服五錢水二鐘薑三片入鹽少許煎空心服

神秘湯　治上氣喘急不得臥

陳皮　桔梗　紫蘇　五味

人參等分

右每服四錢用水煎食後服

四磨湯　治七情鬱結上氣喘急

人參　檳榔　沉香　台烏

右四味各濃磨水取七分盞煎三五沸溫服

三拗湯　治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急

生甘草　麻黃不去節　杏仁不去皮尖等分

右服五錢。水一鍾半。薑五片。煎服。

小青龍湯　治水氣。發喘尤捷。

麻黃　芍藥　甘草炙。　肉桂

細辛　乾薑炮。各三兩。　半夏炮。七次。二兩半。　五味二兩。

右咀。每三錢。煎七分。食後服。

導痰湯　千緡湯　並見痰類。

華蓋散　治感寒而嗽。胸滿聲重。

蘇子　陳皮　赤茯苓　桑白皮

麻黃各一兩。　甘草五錢。或加杏仁。

右爲末。每服二錢。水煎。食後服。

九寶湯　治斃而身熱發喘惡寒。

麻黃　薄荷　陳皮　肉桂

紫蘇　杏仁　甘草　桑白皮

腹皮各等分。

右咀。薑蔥煎服。

蘇子降氣湯　見氣類。

活人書五味子湯

五味半兩。　人參　杏仁

生薑各二錢半。　麥門冬　棗三箇

陳皮

右咀。水煎。

導水丸　見痢類。

咳嗽十六　附肺痿肺癰

○咳嗽有風寒。痰飲。火。勞嗽。肺脹。春作是春升之氣。用清涼藥。二陳加薄荷之類。夏是火氣炎上最重。用芩連。秋是濕熱傷肺。冬是風寒外來以藥發散之後。用半夏逐痰。必不再來。風寒行痰。開腠理。用二陳湯加麻黃桔梗杏仁。逐痰飲。降痰。隨證加藥。火主清金。化痰降火。勞嗽。宜四物湯加竹瀝薑汁補陰爲主。乾咳嗽難治。此係火鬱之證。乃痰鬱其火邪在中。用苦梗開之。下用補陰降火之劑。四物加炒柏竹瀝之類。不已則成勞。此不得志者有之。倒倉法好。肺虛嗽甚。此好色腎虛者有之。用參膏。以陳皮、生薑佐之。大概有痰加痰藥。上半日多嗽者。此屬胃中有火。用貝母、石膏、降胃火。午後嗽多者。屬陰虛。必用四物湯加炒柏、知母、降火。黃昏嗽者。是火氣浮於肺。不宜用涼藥。宜五味子、五倍子、斂而降之。五更嗽多者。此胃中有食積。至此時。火氣流入肺。以知母、地骨皮、降肺火。肺脹

而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物湯加桃仁、訶子、青皮、竹瀝、薑汁之類嗽而脇下痛宜疎肝氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯加南星、香附、青黛、青皮、薑汁血礙氣作嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒薑汁丸服治嗽多用生薑以其辛散故也痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽治嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同勞嗽卽火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石童便浸香附瓜蔞青黛杏仁半夏麴之類薑蜜調陰化必以補陰爲主治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三推骨下兩傍各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之有嗽而肺脹壅遏不得眠者難治肺痿專主養肺氣養血清金嗽而肺氣有餘者宜瀉之桑白皮爲主半夏、茯苓、佐之瀉其有餘補其不足肺燥者當潤之屬熱者桔梗、大力、知母、雞清聲啞者屬寒宜細辛半夏生薑辛以散之肺虛者人參膏阿膠爲主陰不足者六味地黃丸爲要藥或知母茯苓湯爲妙陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些小以降其氣補其陰白芍藥須用酒浸晒乾濕痰帶風喘嗽者不可一味苦寒折之如千緡湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁白藥煎薑汁丸陰化濕痰帶風以千緡湯墜痰丸固捷痰積嗽非青黛瓜蔞不除有食積人面青白黃色不常面上有如蟹爪路一黃一白者是欬逆嗽非蛤粉青黛瓜蔞貝母不除口燥咽乾有痰者不用半夏、

南星用瓜蔞貝母飲水者不用瓜蔞恐泥膈不爽快知母止嗽清肺滋陰降火杏仁瀉肺氣氣虛久嗽者一二服劫止治酒嗽青黛瓜蔞薑蜜丸噙救肺食積痰作嗽發熱者半夏南星爲君瓜蔞蘿蔔子爲臣青黛石鹹爲使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大概耳亦當明其是否也

【入方】治痰嗽

杏仁去皮尖　蘿蔔子各半兩

右爲末粥丸服

清化丸　治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

貝母　杏仁　青黛

右爲末沙糖入薑汁泡蒸餅丸如彈大噙化

治久嗽風入肺

鵝管石　雄黃　礬金　款花

右爲末和艾中以生薑一片安舌上灸之以烟入喉中爲度

○飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜蔞杏連丸

治欬嗽劫藥。

五味子五錢。　甘草二錢半　五倍子　風化硝各四錢。

右爲末。蜜丸。噙化。又云乾噙。

治欬嗽聲嘶者。此血虛火多。

青黛　蛤粉

右爲末。蜜調。噙化。

治嗽喘去濕痰。

白朮　半夏　蒼朮　貝母

香附各一兩。　杏仁去皮尖。炒。　黃芩各半兩。

右爲末。薑汁打糊丸。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

青黛　瓜蔞仁　香附童便浸。晒乾。

右爲末。薑蜜調。噙化。

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩。　半夏一兩。　青黛

黃連　瓜蔞子　石醎　蘿蔔子各半兩。
皂角炭　防風各三錢。
右爲末。神麴糊丸服。
治勞嗽吐紅。
人參　白朮　茯苓　百合
紅花　細辛　五味　官桂
阿膠　黃芪　半夏　杏仁
甘草　白芍　天門冬
右剉。水煎。○若熱。去桂、芪。用桑白皮、麻黃不去節、杏仁不去皮、同煎、
又方　治嗽血。
紅花　杏仁去皮尖。　枇杷葉去毛。　紫花茸
鹿茸炙。　木通　桑白皮又云加大黃。
右爲末。煉蜜丸。噙化。
嗽烟筒　治痰嗽久遠者。
佛耳草　款花二錢。　鵝管石　雄黃半錢。

右爲末。鋪艾上。捲起。燒烟吸入口內。細茶湯送下。定嗽劫藥。

訶子　百藥煎　荆芥穗

右爲末。蜜丸。噙化。

又方　治心煩欬嗽等證。

六一散加辰砂服。

清金丸　治食積火鬱嗽劫藥。

貝母　知母各半兩爲末。　巴豆去油膜半錢。

右爲末。薑泥丸。辰砂爲衣。食後服。每五丸。白湯下。一云青黛爲衣。

清金丸　一名與點丸。與清化丸同用。瀉肺火。降膈上熱痰。

片子黃芩炒。

右爲末。糊丸。或蒸餅丸。梧子大。服五十丸。

清化丸　與清金丸同用。專治熱嗽及咽痛。故苦能燥濕。熱輕能治上。

燈籠草炒。

右爲末。蒸餅丸。〇又細末。醋調。敷咽喉間痛。

又方　治痰嗽。

礞石半兩煅　風化硝二錢半　半夏二兩
茯苓　陳皮各七錢半　黃芩半兩
右爲末粥丸
又方　治痰嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之
粟殼四兩蜜炒去蒂膜　烏梅一兩　白朮一兩
款花半兩　桔梗半兩　兜鈴一兩　人參半兩
右爲末蜜丸彈子大含化
蒼莎丸　調中散鬱
蒼朮　香附各四兩　黃芩二兩
右爲末蒸餅丸梧子大每服五十丸食後薑湯下
人參清肺散　治痰嗽咽乾聲不出
人參一錢半　陳皮一錢半　半夏一錢　桔梗一錢
麥門冬半錢　五味十箇　茯苓一錢　甘草半錢
桑白皮一錢　知母一錢　地骨皮一錢　枳殼一錢
貝母一錢半　杏仁一錢　款花七分　黃連一錢

右水煎。生薑三片。

六味地黃丸　見諸虛。

千緡湯　墜痰丸　見痰類。

○肺痿治法在乎養血、養肺、養氣、清金。曾治一婦人。二十餘歲。胸膺間一竅。口中所咳膿血。與竅相應而出。以人參、黃芪、當歸、補氣血之劑。加退熱排膿等藥而愈。

〔附錄〕金匱方論曰。熱在上焦者。因欬而肺痿得之。或從汗出。或從嘔吐。或消渴小便利數或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故寸口脈數。其人欬。口中有濁唾涎沫者。爲肺痿之病。其人脈數虛者是。

【附方】

海藏紫菀散　治欬中有血。虛勞肺痿。

人參一錢。　紫菀半錢。　如母一錢半。　貝母錢半。

桔梗一錢。　甘草半錢。　五味十五箇。　茯苓一錢。

阿膠炒半錢。

右咬咀。水煎。

知母茯苓湯　治欬嗽不已。往來寒熱。自汗肺痿。

甘草　茯苓各一兩。　知母　五味

細辛　款花　經霜桑葉　杏仁炒。
天門冬去心。半夏　五味各一兩。甘草半兩。

右每服四錢。水煎。生薑五片。

○氣嗽加木香。唾血而熱加生地黃。唾血而寒加鍾乳粉。疲極咳嗽加黃芪。損肺欬血加沒藥。藕節。嘔逆腹滿不食加白朮。欬而小便多者加益智。欬而面浮氣逆加沉香、橘皮。

勞瘵十七

○勞瘵主乎陰虛。痰與血病。虛勞漸瘦屬火。陰火銷爍。卽是積熱。做成始健。可用子和法。後若羸瘦。四物湯加減送消積丸。不做陽虛。蒸蒸發熱積病。最多勞病。四物湯加炒栢、竹瀝、人尿、薑汁。大補爲上。肉脫熱甚者難治。

【入方】

青蒿一斗五升。童便三斗。文武火熬。約童便減至二斗。去蒿再熬至一斗。入猪膽汁七枚再熬。數沸。甘草末收之。每用一匙。白湯調服。

〔附錄〕勞瘵之證。非止一端。其始也。未有不因氣體虛弱。勞傷心腎而得之。以心主血。腎主精。精竭血燥。則勞生焉。故傳變不同。骨蒸殗殜。復連尸疰。夫疰者、注也。自上至下。相傳骨肉。乃至滅門者有之。其證。或中有虫嚙心肺間。名曰瘵疰。難以醫治。　傳屍勞瘵。寒熱交攻。久嗽咯血。日見羸瘦。先以三拗湯

與蓮心散煎萬不一失。

【附方】

蓮心散　治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精。

人參　白茯苓　蓮肉各二兩。
甘草　白扁豆炒。　薏苡炒。
乾葛炒。　黃芪各一兩炒。　當歸各半兩。
半夏麴　百合　乾薑炮。
五味　木香　丁香
白芷　神麴炒各一兩

右剉每服五錢。生薑三片。棗同煎空心溫服。

藥令建中湯　治臟腑虛損身體消瘦。潮熱自汗。將成勞瘵。此藥退虛熱。生血氣。

前胡一兩。　細辛　黃芪　人參
橘皮　麥門冬　桂心　當歸
白芍　茯苓　甘草炙一兩。　半夏七錢。

右剉每服四錢。薑三片。棗一枚。水煎服。

黃芪鱉甲散　治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴欬嗽有血

生芐三兩　桑白　半夏三兩半　天門冬五兩
鱉甲醋煑五兩　紫菀二兩半　秦艽三兩三錢　知母
赤芍　黃芪各三兩半　人參　肉桂
桔梗二兩六錢半　白茯苓　地骨皮　柴胡三兩三錢
甘草二兩半

右剉每服三錢水煎服

清骨散　治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

北柴胡　生芐各二兩　人參
熟芐　秦艽各一兩　赤芍一兩　防風
薄荷七錢半　胡黃連半兩

右每服四錢水煎溫服

三拗湯　見喘類

〔附錄〕葛可久先生勞症十藥神書內摘書七方　夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養眞元固守根本則萬病不生四體康健若曰不養眞元不固根本疾病由是生焉且眞元根本則氣血精液也

余嘗聞先師有言曰。萬病莫若勞症最爲難治。蓋勞之由。因人之壯年。氣血完聚。精液充滿之際。不能保養性命。酒色是貪。日夜躭嗜。無有休息。以致耗散眞元。虛敗精液。則嘔血吐痰。以致骨蒸體熱。腎虛精竭。面白頰紅。口乾咽燥。白濁遺精。盜汗飮食艱難。氣力全無。謂之火盛金衰。重則半年而斃。輕則一載而亡。況醫者不究其源。不窮其本。或投之以大寒之劑。或療之以大熱之藥。妄爲施治。絕不取效。殊不知大寒則愈虛其中。大熱則愈竭其內。所以世之醫勞者。萬無一人焉。先師用藥治勞。如弭之射。無不中的。今開用藥次第于後。用藥之法。如嘔吐咯嗽血者。先以十灰散遏住。如甚者。須以花蕊石散止之。大抵血熱則行。血冷則凝。見黑必止。理之必然。止血之後。其人必倦。其體。次用獨參湯一補。令其熟睡一覺。不要驚動。睡起病去五六分。後服諸藥。

保和湯止嗽寧肺　保眞湯補虛除熱

太平丸潤肺除痰　消化丸下痰消氣

保和湯內。分血盛、痰盛、喘盛、熱盛、風盛、寒盛、六事。加味和之。　保眞湯內。分驚悸、淋濁、便澁、遺精、燥熱、盜汗、六事。加味用之。餘無加用。服藥之法。每日仍濃煎薄荷湯漱嗽喉中。用太平丸先嚼一丸。徐徐嚥下。次嚼一丸。緩緩溶化。至上床時。亦如此用之。夜則肺竅開。藥必流入竅中。此訣要緊。如痰壅却。先用飴糖拌消化丸一百丸吞下。次又依前嚼嚼太平丸。令其仰面臥而睡。服前七藥後。若肺有嗽。可煮潤肺丸食之。如常七藥之前有餘暇。煮此服之。亦可續煮白鳳膏食之。固其根源。完其根本。病可之後。方

可合十珍丸服之此爲收功起身之妙用也

十灰散　治勞症嘔血咯血嗽血先用此遏之

大薊　小薊　柏葉　荷葉

茅根　茜根　大黃　山梔

牡丹皮　棕櫚灰

右等分燒灰存性研細用紙包碗蓋地上一夕出火毒用時先以白藕搗碎絞汁或蘿蔔搗絞汁亦可磨眞京墨半碗調灰五錢食後服病輕用此立止病重血出升斗者如神之效

又方

花蕊石燒過存性研如粉

右用童子小便一盞煎醋調末三錢極甚者五錢食後服如男子病則和酒一半婦人病則和醋一半一處調藥立止其瘀血化爲黃水服此藥後其人必疎解其病體却用後藥而補

獨參湯　治勞症後以此補之

人參一兩去蘆

右㕮咀水二鍾棗五箇煎不拘時細細服之

保和湯　治勞嗽肺燥成痿者服之決效

知母　貝母　天門冬　麥門冬
款花各三錢.　天花粉　薏苡　杏仁炒.各二錢.
五味　粉草炙.　兜鈴　紫苑
百合　桔梗各一錢.　阿膠炒.　當歸
生芐　紫蘇　薄荷各半錢.

○一方無地黃有百部.
右以水煎.生薑三片.入飴糖一匙.入藥內服之.每日三服.食後.進加減于後.
○血盛加蒲黃、茜根、藕節、大薊、茅花.
痰盛加南星、半夏、橘紅、茯苓、枳殼、枳實、括蔞實炒.喘盛加桑皮、陳皮、大腹皮、蘿蔔子、葶藶、蘇子.
熱盛加山梔子、炒黃連、黃芩、黃柏、連翹.
風盛加防風、荊芥、金沸草、甘菊、細辛、香附.
寒盛加人參、芎藥、桂皮、五味、薑片.

保眞湯　治勞症體虛骨蒸.服之決補.
當歸　生芐　熟芐　黃芪
人參　白朮　赤苓　白苓各半錢.

天門　麥門　赤芍　知母
黃柏炒　五味　白芍　柴胡
地骨　甘草　陳皮各二錢　蓮心半錢

右以水煎生薑三片棗一枚食後服

○驚悸加茯神遠志柏子仁酸棗仁　淋濁加萆薢台烏藥猪苓澤瀉便澁加木通石葦萹蓄　遺精加龍骨牡礪蓮鬚連子　燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲　盜汗加浮麥子炒牡礪黃芪麻黃根

太平丸　治勞症欬嗽日久肺痿肺癰考宜噙服

天門　麥門　知母　貝母
款花　杏仁各二錢　當歸　生苄
黃連　阿膠炮各兩半　蒲黃　京墨
桔梗　薄荷各一兩　北蜜四兩　射香少許一方有熟苄

右將蜜煉和丸如彈子大食後濃煎薄荷湯先潠嗽喉中細嚼一丸津唾送下上床時再服一丸如痰盛先用飴糖拌消化丸一百丸送下後即嚥嚼此丸仰面睡從其流入肺竅

消化丸

白茯二兩　枳實一兩半　青礞石煅黃金色二兩

白礬枯。　橘紅二兩。　牙皂二兩。火炙。　半夏二兩。
南星二兩。　枳殼一兩半。　薄荷葉一兩。
右爲末。以神麴打糊丸。如梧桐子大。每服一百丸。上床時飴糖拌吞。次嗽嚼太平丸二藥相攻。痰嗽搐迹除根。

潤肺膏

羊肺一具。　杏仁一兩。淨研。　柿霜　眞酥
蛤粉各一兩。　白蜜二兩。
右先將羊肺洗淨。次將五味入水攪粘、灌入肺中。白煮熟。如常服食。與前七藥相間服之。亦佳。

吐血十八

○吐血。陽盛陰虛。故血不得下行。因火炎上之勢而上出。脈必大而芤。大者發熱。芤者血滯與失血也。大法。補陰抑火。使復其位。用交趾桂五錢爲末。冷水調服。　山梔子最清胃脘之血。吐血覺胸中氣塞。上吐紫血者。桃仁承氣湯下之。　先吐絕。後見痰嗽。多是陰虛火動。痰不下降。四物湯爲主。加痰藥、火藥。先痰嗽。後見紅。多是痰積熱。降痰火爲急。　痰嗽涎帶血出。此是胃口清血。熱蒸而出。重者梔子。輕者藍實。　或暴吐紫血一碗者。無事。吐出爲好。此熱傷血。死於中。用四物湯、解毒湯之類。　吐血挾痰。積吐一二碗者。亦只補陰降火。四物加火劑之類。　挾痰若用血藥。則泥而不行。只治火則止。吐血、火病也。

大吐紅不止。以乾薑炮末。童便調從治。噙腕痰血。用荊芥散。舌上無故出血。如線不止。以槐花炒末乾摻之。若吐血一方。童便一分。酒半分。擂柏葉溫飲。非酒不行。嘔吐血出於胃也。實者犀角地黃湯主之。虛者小建中湯加黃連主之。

【入方】

二黃補血湯　治初見血。及見血多。宜服。

熟芐一錢。　生芐五分。　當歸七分半。　柴胡五分。
升麻　白芍二錢。　牡丹皮五分。　川芎七分半。
黃芪五分。

右以水煎服。血不止。可加桃仁半錢。酒大黃酌量虛實用之。內却去柴胡、升麻。

又方　治見血後。脾胃弱。精神少。血不止者。

人參一錢。　黃芪三錢。　五味十三箇。　芍藥
甘草五分　當歸五分。　麥門冬五分。

右咬咀。水煎服。加玉金研入亦可。

又方

人參一錢。　白朮一錢。　茯苓一錢。　半夏麴五分。

陳皮一錢.　甘草　青皮三分　川芎五分.
神麴三分.
右咬咀.水煎服.　如胃不和.加藿香.　如渴者.加葛根半錢.　若痰結塊者.加貝母一錢.黃芩半錢去白.陳皮半錢.　若小便赤色.加炒黃柏半錢.　若大便結燥.加當歸七分.心煩.加黃連酒拌曬乾半錢.　若小便滑.加煅牡礪.　如見血多去半夏.恐燥.加生芐一錢.牡丹半錢.桃仁三分.　若胃中不足.飲食少進.加炒山梔子仁八分.　若血溢入濁道.留聚隔間.滿則吐血.宜蘇子降氣湯.加人參、阿膠、各半錢.　上膈壅熱吐血者.以四湯仁加荊芥、阿膠、各半錢.更不止.於本方中加大黃、滑石、各半錢.　胃傷吐血.宜理中湯加川芎、乾葛、各半錢.此是飲酒傷胃也.吐血不止.用生茜根爲末二錢.水煎.放冷.食後服良.　白芨末調治.治吐血.

已上諸方.雖非丹溪所出.以其藥同.故錄於前.

〔附錄〕凡血證上行.或唾或嘔或吐.皆逆也.若變而下行爲惡痢者.順也.上行爲逆.其治難.下行爲順.其治易.故仲景云.衄血證下血者.當自愈也.與此意同.若無病人忽然下痢.其病進也.今病血證上行.而復下行惡痢者.其邪欲去.是知吉也.　諸見血身熱.脈大者難治.是火邪勝也.　身涼脈靜者易治.是正氣復也.故脈訣云.鼻衄吐血沈細宜.忽然浮大卽傾危.

【附方】

四生丸　治吐血。陽乘於陰。血熱妄行。服之良。

生荷葉　生艾葉　生柏葉　生地黃等分。

右爛研如鷄子大。服一丸。水三盞。煎一盞。去滓服。

大阿膠丸　治肺虛、客熱、欬嗽、咽乾、多睡涎沫。或有鮮血勞傷肺胃、吐血、嘔血、並可服。

麥門冬去心。茯神　柏子仁　百部根

杜仲炒。　丹參　貝母炒。　防風各半兩。

山藥　五味　熟芋　阿膠炒。各一兩。

遠志　人參各二錢半。　茯苓一兩。

右爲末。煉蜜丸。如彈子大。每服一丸。水煎六分。和租服。

犀角地黃丸　治傷寒。汗下不解。鬱干經絡。隨氣湧泄。爲衄血。或清通閉塞。流入胃腹。吐出清血。如鼻衄。吐血不盡。餘血停留。致面色痿黃。大便黑者。更宜服之。

犀角鎊。　生芋　白芍　牡丹等分。

右㕮咀。每服五錢。水煎。溫服。實者可服。

桃仁承氣湯

芒硝三錢。　甘草二錢半。　大黃一兩。　桂三錢。

桃仁半兩去皮尖
右㕮咀每兩入薑同煎
斛毒湯　見中暑
荊芥散
荊不穗半兩　炙草一兩　桔梗二兩
右㕮咀薑煎食後服
小建中湯
桂枝　甘草炙三錢　大棗　白芍六錢
生薑二錢　阿膠炒一合
右㕮咀水煎
蘇子降氣湯　見氣類
理中湯　見中寒
咳血十九
○衄血火升痰盛身熱多退血虛四物湯加減用戴云欬血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者毋欬出皆是血疙瘩衄血者鼻中出血也溺血小便出血也下血者大便出血也惟有各

名色分六。俱是熱證。但有虛實新舊之不同。或妄言爲寒者。誤也。

【入方】

青黛　瓜蔞仁　訶子　海粉
山梔

右爲末。以蜜同薑汁丸。噙化。欬甚者加杏仁去皮尖。後以八物湯加減調理。

【附方】

黃芪散　治欬血成勞。

甘草四錢。　黃芪　麥門冬　熟艽
桔梗　白芍各半兩。

右㕮咀。每服半兩。水煎服。

茯苓補心湯　治心氣虛耗。不能藏血。以致面色痿黃。五心煩熱。咳嗽唾血。

茯苓　半夏　前胡　紫蘇
人參　枳殼炒。　桔梗　甘草
葛根各半分。　當歸二兩。　川芎七錢半。　陳皮
白芍各二兩。　熟艽

右咬咀。水薑棗煎。

嘔血二十

○嘔血。火載血上。錯經妄行。脈大發熱。喉中痛者。是氣虛。用參、芪、蜜炙黃柏、荊芥、當歸、生地黃用之。嘔血用韭汁、童便、薑汁、磨鬱金同飲之。其血自清。火載血上。錯經妄行。用四物湯加炒山梔、童便、薑汁。服。又方山茶花、童便、薑汁、酒服。又鬱金末治吐血入薑汁、童便良。又方用韭汁、童便二物。合用鬱金。如細研和服。又方治吐血或衄血上行。用鬱金無用山茶花代。薑汁、童便、合好酒調服。即止。後以犀角地黃湯加鬱金。怒氣逆甚。則嘔血。暴燥內逆。肝肺相搏。血溢鼻口。但怒氣致血證者。則暴甚。故經曰。抑怒以奎陰者是也。否則五志之火動甚。火載血上。錯經妄行也。用柴胡、黃連、黃芩、黃芪、地骨、生熟芍、白芍。以水煎服。虛者以保命生地黃散。再加天門冬、枸杞、甘草、等分。水煎服。

【附方】

治嘔血

黃柏蜜炙

右搗爲末。煎麥門冬湯調二錢匕。立瘥。

聖惠方　治嘔血。

側柏葉

右爲末。不計時。以粥飲調下二錢匕。

保命生地黃散

生芐　熟芐　枸杞　地骨皮

天門冬　黃芪　白芍　甘草

黃芩

右㕮咀。水煎。食前。

咯血二十一　附痰涎血

○咯血。痰帶血絲出者。用薑汁、青黛、童便、竹瀝、入血藥中用。如四物湯加地黃膏、牛膝膏之類。咯唾血出於腎。以天門冬、麥門冬、貝母、知母、桔梗、百部、黃柏、遠志、熟芐、牡礪、薑桂之類。痰涎血出於脾。以葛根、黃芪、黃連、芍藥、當歸、甘草、沉香之類主之。

【入方】治痰中血。

白朮一錢半。　當歸一錢。　芍藥一錢。　牡丹皮一錢半。

桃仁一錢。研。　山梔炒黑、八分。　桔梗七分。　貝母一錢。

黃芩五分。　甘草三分。　青皮五分。

右以水煎服。

又方　治痰中血。

白芨一錢半。　牡丹皮一錢半。　貝母一錢。

桑白一錢。　山梔炒黑一錢一分。　桃仁一錢研。

又方　治痰中血。

橘紅二錢。　半夏五分。　芍藥一錢。

白芨一錢。　枳殼一錢。　甘草三分

桑白一錢。　黃芩一錢。

右以水一鍾。生薑三片。煎服。或加青黛半錢。

又方　茯苓一錢。　甘草三分。

橘紅一錢半。　桔梗一錢。　五味十五箇。

牡丹一錢。　貝母一錢。　人參五分。

大青五分。　茯苓一錢。　甘草五分。

右以水煎。生薑三片。　黃連七分。　桃仁一錢。

【附方】　治咯血。

荷葉不以多少焙乾。

右爲末米湯調二錢匕。

初虞世方　治咯血幷肺痿多痰。

防己　葶藶等分。

右爲末。稜米飲調下一錢。

又方　治咯血及衄血。

白芍一兩。　犀角末二錢半。

右爲末。新汲水服一錢匕。血止爲限。

天門冬丸　治咯血幷吐血。又能潤肺止嗽。

阿膠炮各半兩。　天門冬一兩。

貝母　白茯苓各半兩。

右爲末。蜜丸如彈大。服一丸。噙化。

又方　治咯血。

桑皮一錢半。　半夏一錢。炒。

茯苓一錢。　阿膠炒。半錢。

甘草五分。　杏仁五分。炒。

甘草　知母一錢。

桔梗七分。

生苄一錢。

杏仁炒。　貝母一錢。

陳皮一錢。

山梔七分。炒。

柳桂二分。卽桂之嫩小枝條也。宜入上焦。

右以水煎。生薑三片。

衄血二十二

○衄血。涼血。行血爲主。大抵與吐血同。用山茶花爲末。童便、薑汁、酒、調下。犀角生地黃湯。入鬱金同用。如黃芩、升麻、犀角、能解毒。又以鬱金末。童便。薑汁。幷酒調服。經血逆行。成血腥。或吐血。或唾血。用韭汁服之。立效。治血汁血衄。以人中白。新瓦上火逼乾。入麝香少許。研細。酒調下。經驗。人中白。卽溺盆白堊秋石也。衄血出於肺。以犀角、升麻、梔子、黃芩、芎藥、生地黃、紫菀、丹參、阿膠之類主之。原病式曰。衄者。陽熱怫鬱。干於足陽明。而上熱則血妄行。故鼻衄也。

【附方】

河間生地黃散　治鬱熱衄血。或咯吐血皆治之。

枸杞　天門冬　黃芪　柴胡　白芍　生苄　黃連　甘草　地骨　黃芩　熱苄等分。

右㕮咀。湯煎服。若下血。加地榆。

又方　治衄血。

伏龍肝半升

右以新汲水一大碗。淘取汁。和蜜頓服。

茜根散　治鼻不止。

茜根　阿膠蛤分。炒　梅苓各一兩。　甘草炙。半兩。

側柏葉　生艾

右以水一鍾。薑三片。煎服。

黃芩芍藥湯　治鼻衄不止。

黃芩　芍藥　甘草各等分。

右以水煎服。或犀角地黃湯。如無犀角。以升麻代之。○鼻通於腦。血上溢於腦。所以從鼻而出。凡鼻衄。並以茅花調止。衄散時進淅二匕。仍令其以麻油滴入鼻。或以蘿蔔汁滴入。亦可。又茅花、白芍藥對半尤穩。外迎法。以井花水濕紙頂上。貼之左鼻。以線札左手中指。右出札右手。俱出兩手俱札。或炒黑蒲黃吹鼻中。又龍骨末吹。亦可。

止衄血

黃芪六錢。　赤茯苓　白芍　當歸

生艾　阿膠各三錢。

右爲末每服二錢食後黃芪湯調服

芎附飮

川芎二兩　香附四兩

右爲末每服二錢茶湯調下

又法　治心熱吐血及衄血不止

百葉榴花不以多少

右乾爲末吹出鼻中立瘥

溺血二十三

○溺血屬熱用炒山梔子水煎服或用小薊琥珀有血虛四物加牛膝膏實者用當歸柔氣湯下之後以四物加山梔

【入方】

小薊飮子　治下焦結熱血淋

生苄　小薊　滑石　通草

淡竹葉　蒲黃炒　藕節　當歸酒浸

梔子炒　甘草炙各半兩

右以水煎。空心服。

〔附錄〕溺血。痛者爲淋。下痛者爲溺血。溺血先與生料五苓散加四物湯。若服不效。其人素病於色者。此屬虛。宜五苓散和膠艾湯。吞鹿茸丸。或辰砂香散。四物加生地、黃牛膝。或四物加黃連、棕灰。又六味地黃丸爲要藥。莖中痛。用甘草稍。血藥中少佐地楡、陳皮、白芷、棕灰。刼劑用瑞竹堂蒲黃散。或單用蒲黃。或煎葱湯調鬱金末服之。又文蛤灰入煎劑。妙。大抵小便出血。則小腸氣秘。氣秘則小便難甚。痛者謂之淋。不痛者謂之溺血。並以油髮燒灰存性爲末。新汲水調下。妙。又方。以車前子爲末。煎車草葉。調二錢。服。

【附方】

許令公方　治尿血。

生地黃汁一升。　生薑汁一合。

右以二物相合。頓服瘥。

當歸承氣湯

當歸　厚朴　枳實　大黃

芒硝

生料五苓散　見中暑。

膠艾湯

阿膠　川芎　甘草炙各二兩　川歸

艾葉炒各二兩　熟芋　白芍各四兩

右㕮咀每三錢水酒煎空心熱服

鹿茸丸

鹿茸一兩蜜炙　沉香　附子炮各半兩

當歸　故紙炒　回香炒

右爲末酒糊丸每七十丸空心鹽酒下

沉砂妙香散

射香一錢另研　山藥姜汁炙一兩　人參半兩　兔絲子制一兩

茯苓　茯神　黃芪各一兩　胡盧巴炒各半兩

甘草炙半兩　遠志炒一兩　辰砂三錢　木香煨二錢半

右爲末每二錢溫酒下　桔梗半兩

六味地黃丸　見諸虛

瑞竹堂蒲黃散

故紙炒　蒲黃炒　千年石灰炒

右等分爲細末。每三錢。空心熱酒調下。

下血二十四

○下血其法不可純用寒涼藥。必於寒涼藥中加辛味爲佐。久不愈者。後用溫劑。必兼升舉。藥中加酒浸炒涼藥。和酒煮黃連丸之類。寒因熱用故也。有熱四物加炒山梔子、升麻、蓁艽、阿膠珠。去大腸濕熱。屬虛者。當溫散。四物加炮乾薑、升麻。凡用血藥。不可單行單止也。

【入方】

白芷　五倍子

右爲末。粥丸梧子大。服五十丸。米湯下。

〔附錄〕下血當別其色。色鮮紅爲熱。以連蒲散。又若內蘊熱毒。毒氣入腸胃。或因飲酒過多。及淡糟藏炙煿幷血入大腸。故下血鮮紅。宜黃連丸。或一味黃連煎。餘若大下不至者。宜四物湯加黃連、槐花。仍取血見愁少許。生薑搗取汁。和米大服。於血見愁草中。加入側柏葉。與生薑同搗汁。尤好。毒暑入腸胃下血者。亦宜加味黃連、槐花。入煎服。血色瘀者爲寒。血逐氣走。冷寒入客腸胃。故上瘀血。宜理中湯溫散。若風入腸胃。純下清血。或濕毒並宜胃風散加枳殼、荊芥、槐花。攔撲損惡。血入腸胃。下血濁如瘀血者。宜黑神散加老黃苆爲末。酒調下。內經云。下血爲內傷絡服所致。用枳殼一末服。又方。用黃連

二兩枳殼二兩槐花八兩炒上一米去槐花不用止以二味煎服立效以解絡脈之結也

【附方】

血餘灰　鞋底灰　猪牙皂角灰等分

右爲末酒調三錢匕

又方　治下血刼劑

百藥煎一兩取一半燒爲灰

右爲末糊丸如梧子大服六十丸空心米湯下

槐花散　治腸胃不調脹滿下血

蒼朮　厚朴　陳皮　當歸

枳殼各一兩　槐花二兩　甘草半兩　烏梅半兩

右以水煎空心服

又方　治下鮮血

梔子仁燒灰

右一末水和一錢匕服

又方　治糞前有血面色黃

石榴皮

右爲末煎茄子枝湯調一錢匕

又方　治糞後下血不止

艾葉不以多少

右以生薑汁三合和服

又方

槐花　荆芥穗等分

右爲末酒調下一錢匕仍空心食猪血炒

又方　治臟毒下血

苦練炒令黑

右爲末蜜丸米飲下二十丸尤炒

又方　治卒下血

赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

烏梅丸　治便血下血

烏梅三兩燒灰存性

右爲末醋糊丸梧子大空心服七十丸米湯下

酒煮黃連丸　見泄瀉類

黃連丸

黃連二兩　赤茯苓一兩　阿膠二兩

右用黃連茯苓爲末調阿膠衆手丸每三十丸食後飲下

黃連香薷飲　見中暑

理中湯　見中寒

胃風湯　見下痢

黑神散

百草霜研細

右用酒調下

腸風臟毒二十五

○腸風獨在胃與大腸出　若兼風者蒼朮、蓁艽、芎藥、香附

【入方】

黃芩　秦艽　槐角　升麻

青黛

治腸風下血

滑石　當歸　生芐

甘草　蒼朮等分

右以水煎服．或以蒼朮、生芐不犯鐵器爲末丸服．

又方

茄蒂燒存性．　梔子炒．

右爲末揭飯丸如梧子大每服空心一百丸．米湯下．

又方　便血久遠傷血致虛幷麻風癬見面者

龜板二兩酥炙．　升麻　香附各五錢．　芍藥一兩五錢．

側柏葉　椿根皮七錢五分．

右爲末粥丸以四物湯加白朮、黃連、甘草、陳皮作末．湯調送下丸藥．

又方　脈緩大口渴月經紫色勞傷挾濕．

白朮五錢．　黃柏炒．　生芐　白芍各三錢．

地榆二錢．　黃芩二錢．　香附二錢．

右爲末。蒸餅丸服。

又方　治積熱便血。

蒼朮　陳皮一兩五錢　黃連　黃柏

條芩各七錢五分　連翹五錢。

右爲末。生苄膏六兩丸如梧子大。每服五七十丸。白湯下。

又方

腸風脫露。以車荷鳴五七箇。焙乾。燒灰。醋調搽。仍忌濕麵酒辛熱物。

〔附錄〕腸胃不虛。邪氣無從而入。人惟坐臥風濕。醉飽房勞。生冷停寒。酒麵積熱。以致榮血失道。滲入大腸。此腸風藏毒之所由作也。挾熱下血。清而色鮮。腹中有痛。挾冷下血。濁以色黯。腹中略痛。清則爲腸風。濁則爲臟毒。有先便而後血者。其來也遠。有先血而後便者。其來也近。世俗糞前糞後之說。非也。治法。大要先當解散腸胃風邪。熱則用敗毒散。冷者與不換金正氣散。加川芎、當歸。後隨其冷熱而治之。芎歸湯一劑。又調血之上品。熱者加茯苓、槐花。冷者加茯苓、木香。此則自根自本之論也。雖然精氣血氣生於穀氣。靖爲大腸下血。大抵以胃藥收功。以四君子湯。參苓、白朮散、枳殼散、小烏沉湯和之。胃氣一回。血自循於經絡矣。○腸風者。邪氣幷入。隨感隨見。臟毒者。蘊積毒久而始見。三因方五痔腸風臟毒。辨之甚詳。前二證皆以四物湯加刺蝟皮。

【附方】

蒜連丸一名金屑萬應膏。

獨頭蒜十個。　黃連不以多少。

右先用獨蒜煨香熟。和藥杵勻。丸如梧子大。空心米湯下四十丸。

又方　治腸風。

香附一兩。炒。　枳殼七錢五分。炒。　當歸五錢。

槐花炒。　甘草炙。各二錢五分。　川芎五錢。

右爲粗末。每服三錢。水煎。生薑三片。棗一箇。

敗毒散　見瘟疫。

不換金正氣散

厚朴姜制。　藿香　甘草炙。

蒼朮米泔浸。　陳皮去白。　半夏

右等分。薑三片。棗二箇。煎。食前熱服。

芎歸湯

川芎　當歸

右等分。水煎。

參苓白朮散　見脾胃類。

枳殼散

枳殼麩炒去穰　槐子微炒黃　荊芥穗各五錢

右爲末。每服三錢。薄粟米粥調下。如人行一二里。再用粥壓下。日進二三服。

小烏沉湯

香附二十兩　烏藥十兩　甘草炙一兩

右爲末。湯調下。

痔瘡二十六

○痔瘡專以涼血爲主。

【入方】

人參　黃芪　生牛膝　川芎

當歸和血　升麻　條芩　枳殼寬腸

槐角涼血　生血　黃連

一方無黃連。

熏洗

五倍子　朴硝　桑寄生　蓮房又加荆芥。

煎湯先熏後洗。又冬瓜藤亦好。又大腸熱腫者。用木鱉子、伍倍子、研細末調傅。痔頭向上。是大腸熱甚。收縮而上。用四物湯解毒。加枳殼、白朮、槐角、秦艽。

〔附錄〕痔者。皆因臟腑本虛。外傷風濕。內蘊熱毒。醉飽交接。多慾自戕。以故氣血下墜。結聚肛門。宿滯不散。而衝突爲痔也。其肚邊發露肉珠。狀如鼠乳。時時滴漬膿血。曰牡痔。肛邊生瘡腫痛。突出一枚。數日膿潰即散。曰牝痔。腸口大顆發瘤。且痛且痒。出血淋瀝。曰脈痔。腸內結核有血。寒熱往來。登溷脫肛。曰腸痔。若血痔。則每遇大便。清血隨而不止。若酒痔。則每遇飲酒。發動瘡腫痛而流血。若氣痔。則憂恐鬱怒。適臨乎前。立見腫痛。大便艱難。强力則肛出而不收矣。此諸痔之外證也。治法總要。大抵以解熱調血順氣先之。蓋熱則血傷。血傷則經滯。經滯則氣不運行。氣與血俱滯。乘虛而墜入大腸。此其所以爲痔也。諸痔久不愈。必至穿穴爲漏矣。

【附方】

治諸痔瘡。

槐花四兩。　槐角刺一兩搥碎。　胡椒十粒。　川椒一兩。

右用獖猪肚一箇。入藥在內。扎定口煮熟。去藥。空心食猪肚。

清心丸　素問云諸痛痒瘡皆屬於心心主血熱此藥主之

黃連一兩　茯神　赤芩

右爲末煉蜜丸如梧子大每一百丸食前米湯下

清涼飲　治諸痔熱甚大便秘結

當歸　赤芍　甘草炙

右等分爲末每服二錢新水調下

槐角丸　治諸痔及腸風下血脫肛

槐角一兩　防風　地楡　大黃米上蒸晒

枳殼　黃芩各半兩　當歸

右爲末糊丸如梧子大空心米湯下二十丸

蝟皮丸　治諸痔出裏急疼痛

槐花炒　艾葉炒　枳殼　地楡

當歸　川芎　黃芪　白芍

白礬枯　貫衆　蝟皮一兩炙　頭髮燒三錢

猪後蹄重甲十枚炙焦　皂角一大錠炙黃去皮

右爲末。煉蜜丸梧子大。服五十丸。食前米湯下。

猪甲散　治諸痔。

猪懸蹄甲不以多少。

右爲末。陳米湯調二錢。空心服。

芎歸丸　治痔下血不止。

川芎　當歸　黃芪

地楡　槐花炒。各半兩。　阿膠炒。

木賊　頭髮燒灰。各一錢半。

右爲末。煉蜜丸梧子大。服五十丸。食前米湯下。

乾葛湯　治酒痔。

乾葛　枳殼炒。　半夏　茯苓

生苄　杏仁各半兩。　黃芩二錢半。　甘草同上。

右剉。每服三錢。黑豆一百粒。薑三片。白梅一箇。煎服。

橘皮湯　治氣痔。

橘皮　枳殼炒。　川芎　槐花炒。各半兩。

檳榔　木香　桃仁炒去皮
香附　甘草炙各二分半
右剉每服八錢薑棗煎服
熏洗方
槐花　荆芥　枳殼　紫蘇莖葉
又方
土蠶末二錢　木鱉子七箇取仁研
右以水煎薰洗三兩次如肛門腫熱以朴硝末水調淋之良
又方　治腸痔每大便常有血
右以蒲黃末方寸匕米飲調下日三頓瘥
又方
搗桃葉一斛蒸之內小口器中以下部榻上坐虫自出
地黃丸　治五痔滋陰必用之
地黃酒蒸熟一兩六錢　槐角炒
杜仲炒　白芷各一兩　山藥　黃柏炒　山茱萸

獨活各八錢．　澤瀉　牡丹　茯苓各六錢．
黃芩一兩半．　白附子二錢．
右煉蜜丸如梧子大．空心服五十丸．米湯下．

薰痔方
用無花果葉煮水薰．少時再洗．　又好醋沃燒新磚如法坐薰．良．

又方
大黃三錢．煨．　牡礪一兩．煅．
右爲末．作十服．空心服．

又方
大蒜一片．頭垢捻成餅子．先安頭垢餅於痔上．外安蒜艾灸之．

翻花痔
荊芥、防風、朴硝、煎湯洗之．次用木鱉子、鬱金、研末．入龍腦些少．水調付．　又方．熊膽、片腦、和勻．貼之．

漏瘡二十七
○漏瘡．先須服補藥．生氣血．用參、朮、芪、芎、歸爲主．大劑服之．外以附子末．津唾和作餅子．如錢厚．以艾灸．漏大灶大．漏小灶小．但灸令微熱．不可使痛．乾則易之．則再研如末作餅再灸．如困則止．來日再灸．直

至肉平爲效。亦有用附片灸。仍用前補劑作膏貼之。尤妙。痔漏。涼大腸。覓大腸。用枳殼去穰。入巴豆鐵線纏煮透。去巴豆。入藥用丸子則爛搗用煎藥。乾用寬腸。滋竅用赤石脂、白石脂、枯礬、黃丹、腦子。漏竅外塞用童子小便煆爐甘石、牡礪粉。

【入方】

黃連散　元有痔漏。又於肛門邊生一塊皮厚腫痛。作膿。就在痔孔出。作食積注下治。

黃連　阿魏　神麴　山查　桃仁　連翹　槐角　犀角等分。

右爲末。以少許置掌心。時時舐之。津液咽下。如消三分之二。止後服。

〔附錄〕漏者。諸瘘之潰漏也。狼瘘、鼠瘘、螻瘘、蛄瘦、蜂瘦、蚍蜉瘦、蟒螬瘦、浮蛆瘦、轉筋瘦。古所謂九瘦是爾。析而言之。三十六種。其名目又不同焉。大抵外傷四氣。內窘七情。與夫飲食乖常。染觸蠢動。含靈之毒。未有不變爲瘦瘡。穿孔一深。膿汁不盡。得冷而風邪併之。於是涓涓而成漏矣。然有近年漏者。有久年漏者。近則帶淡紅。或微腫。或小核。久則上而槁白。內而黑爛。淫虫惡臭生焉。

【附方】

猪腎丸　通行漏瘡中惡水自大腸中出。

黑牽牛碾細末二錢半。入猪腎中。以線扎。青竹葉包。慢火煨熟。空心溫酒嚼下。

乳香丸　治冷漏。

乳香二錢半　牡礪粉一錢二分半。

右爲末。雪糕糊丸麻子大。每服三十丸。薑湯空心。

生地黃膏　治漏瘡通用。

露蜂房炙。五倍子　木香三錢。

輕粉一字。　乳香一錢。

右爲末。用生地黃一握。搗細。和爲膏。攤生絹上貼。

蛇蛻散　治漏瘡血水不止。

蛇皮焙焦。五倍子　龍骨各二錢半。

右爲末。入射香少許。津唾調傅。　續斷五錢。

薰漏瘡方

艾葉　五倍子　白膠香　苦練根等分。

右剉碎燒香。法置長桶內。坐熏瘡處。

洗漏瘡方　治漏瘡孔中多有惡穢。常須避風洗淨。

露蜂房。白芷煎湯洗。　或大腹皮、苦參煎湯洗。

右洗畢候水出拭乾先用東向石榴皮晒爲末乾摻以殺淫虫少頃傅藥

久痿方

九孔蜂房炙黃

右爲末臘月猪脂研傅候收汁以龍骨降香節末入些乳香硬瘡

漏瘡 或腿足先是積熱所注久則爲寒

附子破作兩片用人唾浸透初成片安漏孔上艾灸

又方

川芎半兩 細辛 白芷梢一錢半

右爲末每日作湯服之病在下食前服在上食後服看瘡大小討隔年黃麻根刮去皮搓成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之